

第十五章 临终患者的护理

一、A1

1. 关于临终患者各个时期的心理反应与表现匹配的是
 - A. 否认期：“不可能的，我有很多钱，一定有医院可以救我的！”
 - B. 愤怒期：“不，不可能，不会是我！这不是真的！你们一定是搞错了！”
 - C. 忧郁期：“如果能让我好起来，我一定投资更多的公益事业。”
 - D. 协议期：“不要理我，我只想一个人静静的等待死亡。”
 - E. 接受期：“让孙子回来看我，遗产事宜我准备交代给王律师。”
2. 尸体护理评估的内容不包括
 - A. 死者的疾病诊断
 - B. 死者的身体清洁程度
 - C. 死者生前的宗教信仰
 - D. 尸体的创口和引流情况
 - E. 家属为死者准备的物品情况
3. 死亡过程分期的第三期是
 - A. 心理死亡期
 - B. 濒死期
 - C. 脑死亡期
 - D. 临床死亡期
 - E. 生物学死亡期
4. 目前医学界主张的死亡诊断依据是
 - A. 瞳孔散大固定
 - B. 心跳停止
 - C. 组织细胞仍有微弱而短暂的代谢活动
 - D. 深反射消失
 - E. 脑死亡
5. 对濒死期循环衰竭临床表现的描述，不正确的是

- A. 皮肤苍白、斑点
 - B. 胃肠蠕动增快而腹胀
 - C. 心音低而弱
 - D. 肌肉张力下降，大小便失禁
 - E. 血压下降，四肢湿冷
6. 下列不属于尸体护理意义的是
- A. 安慰死者家属
 - B. 是家属宣泄感情的一种方法
 - C. 维持尸体良好的外观
 - D. 是整体护理的最后步骤
 - E. 使尸体易于辨认
7. 患者的临终状态又称为
- A. 临床死亡期
 - B. 脑死亡期
 - C. 生物学死亡期
 - D. 濒死期
 - E. 代谢衰退期
8. 临幊上进行尸体护理的依据是
- A. 呼吸停止
 - B. 各种反射消失
 - C. 心跳停止
 - D. 意识丧失
 - E. 医生做出死亡诊断后
9. 判断患者临幊死亡期的主要指标是
- A. 肌张力减退
 - B. 心跳、呼吸停止
 - C. 桡动脉搏动不可触及
 - D. 瞳孔对光反射迟钝
 - E. 新陈代谢终止
10. 尸斑通常出现在死亡后
- A. 2~4 小时
 - B. 4~6 小时
 - C. 6~8 小时
 - D. 8~10 小时
 - E. 10~12 小时

11. 死亡的诊断依据不包括

- A. 反射消失
- B. 呼吸、心跳停止
- C. 四肢冰冷
- D. 瞳孔散大而固定
- E. 心电图呈直线

12. 进行尸体护理，下列做法不妥的是

- A. 置尸体去枕平卧
- B. 装上活动假牙
- C. 必要时用绷带托扶下颌
- D. 有伤口者要更换敷料
- E. 各孔道用棉花填塞

13. 临终患者临终阶段的心理反应，一般排列顺序为

- A. 否认期、忧郁期、协议期、愤怒期、接受期
- B. 否认期、协议期、愤怒期、接受期、忧郁期
- C. 否认期、愤怒期、协议期、忧郁期、接受期
- D. 忧郁期、愤怒期、否认期、协议期、接受期
- E. 忧郁期、否认期、愤怒期、协议期、接受期

14. 护士为死亡患者进行尸体护理的目的不包括下列哪一项

- A. 对死者人格的尊重
- B. 给家属以安慰，减轻哀痛
- C. 保持尸体整洁，易于辨认
- D. 风俗习惯的沿袭
- E. 人道主义精神和护理职业道德的体现

15. 大脑出现不可逆变化的阶段是

- A. 濒死期
- B. 临床死亡期
- C. 生物学死亡期
- D. 临终状态
- E. 以上都不是

二、A2

1. 患者，男，78岁。胰腺癌晚期，对其进行临终关怀。下列不属于临终关怀目的的是

- A. 向患者提供生理、心理和社会等方面的整体照顾

- B. 保护患者尊严，提高生存质量
- C. 控制患者症状，缓解其痛苦
- D. 积极治疗疾病，尽可能延长患者的生命
- E. 减轻患者家属的精神压力

2. 一位肿瘤晚期患者向医生诉说“虽然我得的是恶性肿瘤，但你们一定要使用最先进的疗法，我会全力配合，只要我们不放弃，希望总是有的，我会好起来的”。该患者处在心理反应的

- A. 忧郁期
- B. 协议期
- C. 接受期
- D. 否认期
- E. 愤怒期

3. 患者，王某，48岁。车祸后ICU治疗多日，目前出现深度昏迷，对强烈刺激完全无反应，无自主呼吸，瞳孔散大、固定、对光反射消失，脑电波平坦，判断其为

- A. 休克
- B. 脑死亡
- C. 濒死状态
- D. 晕厥
- E. 生物学死亡

4. 患者，男性，50岁。尿毒症，目前神志模糊，肌张力消失，心音低钝，脉搏细弱。血压下降，呼吸呈间歇呼吸，该患者处于

- A. 濒死期
- B. 临床死亡期
- C. 躯体死亡期
- D. 生物学死亡期
- E. 脑死亡期

5. 患者，女性，64岁。肺癌，抗癌治疗效果差。患者情绪不稳定，经常生气，抱怨，与家属争吵，此时患者心理反应处于

- A. 忧郁期
- B. 愤怒期
- C. 否认期
- D. 协议期
- E. 接受期

6. 患者，女性，75岁。多器官功能衰竭，表现为意识模糊，肌张力消失，心音低钝，血压70/40 mmHg，潮式呼吸。此时患者处于

- A. 濒死期
- B. 生物学死亡期
- C. 机体死亡期
- D. 临床死亡期
- E. 脑死亡期

7. 患者，女性，79岁。现处于临终状态，护理该患者的主要措施是

- A. 置肢体于功能位
- B. 帮助患者刷牙
- C. 检验生化指标
- D. 帮助其行走
- E. 减轻疼痛

8. 患者，女性，67岁。胰腺癌晚期，自感不久于人世，常常一人呆坐，泪流满面，十分悲哀。相应的护理措施为

- A. 维持患者希望
- B. 鼓励患者增强信心
- C. 指导患者更好配合
- D. 尽量不让患者流露失落情绪
- E. 安慰患者并允许家属陪伴

9. 某冠心病患者死亡3小时后，家属为其更换衣服时发现腰背部出现暗红色条纹，这种现象说明尸体出现了

- A. 尸冷
- B. 尸斑
- C. 尸僵
- D. 尸体腐败
- E. 尸体受伤

10. 患者，女性，60岁，宫颈癌末期，常常自语“这不公平，为什么是我？！”出现这种心理反应，提示患者处于

- A. 接受期
- B. 否认期
- C. 愤怒期
- D. 协议期

E. 忧郁期

11. 某癌症晚期患者，处于临终状态。感到恐惧和绝望。当其发怒时，护士应

- A. 热情鼓励，帮助其树立信心
- B. 指导用药，减轻患者痛苦
- C. 说服患者理智面对病情
- D. 理解、陪伴、保护患者
- E. 同情照顾。满足患者要求

12. 在医院病故的传染病患者，护士用消毒液清洁尸体后，填塞尸体孔道的棉球应浸有

- A. 1%氯胺溶液
- B. 过氧化氢溶液
- C. 生理盐水
- D. 乙醇
- E. 碘酊

13. 患者，男，45岁。当天上午被诊断肝癌。在与患者沟通中，患者的哪项表述提示其处于震惊否认期

- A. “我身体那么好，得肝癌是因为酒喝得太多吗？”
- B. “你看我能吃能睡，癌症患者有这样的吗？再查查吧！”
- C. “我的孩子还没毕业，我这一病怎么办？”
- D. “能帮我打听一下哪里治肝癌的效果特别好吗？”
- E. “你们去忙吧，别管我。”

三、A3/A4

1. 患者，男，27岁。车祸伤及内脏出现循环衰竭症状，经抢救无效死亡。

(1)护士进行尸体护理的前提是

- A. 患者的心跳呼吸停止后
- B. 患者的意识丧失之后
- C. 抢救工作效果不显著时
- D. 在家属的请求之后
- E. 医生作出“死亡”诊断之后

(2)尸体护理时，为了防止面部淤血，易于辨认。护士应采取的护理措施是

- A. 洗脸，闭合眼睑

- B. 头下垫枕头
- C. 擦洗身体，填塞身体孔道
- D. 第一张尸体识别卡系于右手腕部
- E. 第二张尸体识别卡别在尸单外面的腰部

答案

A1: 1-5 AEEEB 6-10 BDEBA 11-15 CACDC

A2: 1-5 DBBAB 6-10 AEEBC 11-13 DAB

A3: (1)E (2)B