

第十章 药物疗法与过敏试验法

一、A1

1. 碘过敏试验的各方法中，数据不准确的一项是
 - A. 口服法时口服 5 mL，观察 3 天
 - B. 皮内注射法时注射 0.1 mL，20 分钟后观察
 - C. 静脉注射法时推注 10 mL，5~10 分钟后观察
 - D. 皮内注射法时的阳性结果是红肿硬块直径超过 1 cm
 - E. 过敏试验应在造影前 1~2 天做
2. 最常用、最方便，既经济又安全的给药方法是
 - A. hs
 - B. pc
 - C. po
 - D. ID
 - E. H
3. 青霉素皮试液的浓度是
 - A. 150 U/mL
 - B. 0.75 mg/mL
 - C. 5 mg/mL
 - D. 2500 U/mL
 - E. 500 U/mL
4. 配制破伤风抗毒素皮试液的标准为每 0.1 mL 含破伤风抗毒素
 - A. 5 IU
 - B. 15 IU
 - C. 50 IU
 - D. 200 IU
 - E. 500 IU
5. 患者发生青霉素过敏性休克时，最早、最常见的症状是
 - A. 烦躁不安、血压下降
 - B. 四肢麻木、头晕眼花
 - C. 腹痛、腹泻

- D. 发绀、面色苍白
- E. 皮肤瘙痒、喉头水肿
- 6. 链霉素过敏反应时,使用葡萄糖酸钙的目的是
 - A. 维持血压
 - B. 解除支气管痉挛
 - C. 减轻毒性症状
 - D. 兴奋呼吸中枢
 - E. 缓解皮肤瘙痒
- 7. 青霉素过敏的血清病型表现是
 - A. 发热,关节肿痛
 - B. 皮肤发绀,血压下降
 - C. 胸闷气促,伴濒危感
 - D. 腹痛,便血
 - E. 面色苍白,四肢麻木
- 8. 静脉注射时止血带应扎在穿刺部位上方约
 - A. 2 cm
 - B. 4 cm
 - C. 6 cm
 - D. 8 cm
 - E. 10 cm
- 9. 皮下注射部位错误的是
 - A. 上臂三角肌下缘
 - B. 前臂掌侧下段
 - C. 后背
 - D. 大腿外侧方
 - E. 腹部
- 10. 以下关于皮内注射方法的叙述,正确的是
 - A. 用稀碘酊消毒皮肤
 - B. 与皮肤呈 15° 角进针
 - C. 进针后抽回血
 - D. 推药液于真皮下
 - E. 拔针后不按压
- 11. 关于静脉注射的操作,正确的是
 - A. 在穿刺部位上方 3 cm 处扎紧止血带
 - B. 用左手拇指绷紧静脉上端皮肤

- C. 进针角度与皮肤呈 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 角
 - D. 刺入静脉后即缓慢注入药液
 - E. 拔针时动作宜慢
12. 药物过敏试验常用的注射部位是
- A. 腹部
 - B. 上臂外侧
 - C. 上臂内侧
 - D. 前臂掌侧上段
 - E. 前臂掌侧下段
13. 为 2 岁以下的婴幼儿做肌肉注射时，正确的做法是
- A. 选择脂肪层较厚的部位
 - B. 选择臀大肌
 - C. 勿将针梗全部刺入
 - D. 两侧臀大肌交替使用
 - E. 刺激性强的药宜先注
14. 有关无痛注射的叙述，错误的是
- A. 解除思想顾虑
 - B. 刺激性强的药物先注射
 - C. 注意配伍禁忌
 - D. 刺激性药物的针头宜粗长
 - E. 注射时要两快一慢
15. 氧气雾化吸入，氧流量应调节为
- A. 0.5 L/min
 - B. 1~2 L/min
 - C. 2~4 L/min
 - D. 5~6 L/min
 - E. 6~8 L/min
16. 助消化药服用的时间是
- A. ac
 - B. pc
 - C. prn
 - D. am
 - E. DC
17. 需要避光保存的药物是
- A. 盐酸肾上腺素

B. α -糜蛋白酶

C. 酵母片

D. 葡萄糖酸钙

E. 洋地黄

18. 应避开明火保管的药物是

A. 次氯酸钠

B. 洗必泰

C. 新洁尔灭

D. 环氧乙烷

E. 漂白粉

19. 护士在给患者发药时，需要遵循“三查七对”的给药原则，下面不属于“七对”的是

A. 患者姓名

B. 患者床号

C. 药物名称

D. 药物剂量

E. 药物作用

20. 关于剧毒药、麻醉药的保管，下列说法不妥的是

A. 专人负责

B. 加锁保管

C. 专本登记

D. 凭空领取

E. 登记本由医生签名

21. 易挥发、潮解、风化的药物保管时应

A. 远离明火

B. 放入冰箱内

C. 装密封瓶并盖紧

D. 专人负责保管

E. 用黑纸遮盖保存

22. “每小时 1 次”的外文缩写是

A. qid

B. qod

C. qh

D. qn

E. qd

23. “隔日 1 次”的外文缩写是

- A. qd
- B. bid
- C. tid
- D. qid
- E. qod

24. 皮下注射给药，下述步骤哪项是错误的

- A. 药液不足 1 mL 可选择 1 mL 注射器
- B. 注射部位可选择三角肌下缘
- C. 针头与皮肤呈 $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$ 角进针
- D. 抽吸无回血后推注药液
- E. 注射毕用无菌干棉签轻压进针处，快速拔针

25. 超声雾化吸入的疗效保证来自于药液气雾可深入到

- A. 大支气管
- B. 支气管
- C. 咽喉
- D. 叶支气管
- E. 肺泡

26. 护士在使用下列药物时，必须避光的是

- A. 维生素 B
- B. 尼可刹米
- C. 硝普钠
- D. 鱼腥草
- E. 卡托普利

27. 下列药物中，不属于升压药的是

- A. 间羟胺
- B. 异丙肾上腺素
- C. 多巴胺
- D. 阿托品
- E. 去甲肾上腺素

28. 护士采取股外侧肌注射的情况是

- A. 药物过敏试验
- B. 多次注射
- C. 预防接种注射
- D. 一次注射

E. 混合剂注射

29. 肌肉注射时, 护士为患者采取可以使臀部肌肉放松的姿势是

A. 侧卧位, 下腿稍弯, 上腿稍伸直

B. 平卧位, 膝部弯曲

C. 俯卧位, 足尖分开、足跟相对

D. 坐位, 身体前倾

E. 侧卧位, 上腿稍弯, 下腿稍伸直

30. 患者宁某, 糖尿病住院治疗, 医嘱皮下注射普通胰岛素 8 U, ac 30 分, ac 的执行时间是

A. 早上 8:00

B. 晚上 8:00

C. 临睡前

D. 饭前

E. 必要时

31. 下列有关超声雾化吸入的目的, 不正确的叙述是

A. 预防感染

B. 解除痉挛

C. 消除炎症

D. 稀释痰液

E. 缓解缺氧

32. 链霉素过敏试验液 0.1 mL 含链霉素

A. 200 U

B. 250 U

C. 300 U

D. 400 U

E. 500 U

33. 超声波雾化器在使用中, 水槽内水温超过一定温度应调换冷蒸馏水, 此温度是

A. 30℃

B. 40℃

C. 50℃

D. 60℃

E. 70℃

34. 发挥药效最快的给药途径是

- A. 静脉注射
 - B. 皮下注射
 - C. 口服
 - D. 外敷
 - E. 吸入
35. 服用止咳糖浆的正确方法是
- A. 饭前服，服后立即饮少量水
 - B. 饭后服，服后立即饮大量水
 - C. 睡前服，服后立即饮少量水
 - D. 咳嗽时服，服后立即饮大量水
 - E. 在其他药物后服，服后不立即饮水
36. 应放在 4℃ 冰箱内保存的药物是
- A. 青霉素
 - B. 氨茶碱
 - C. 泼尼松
 - D. 苯巴比妥钠
 - E. 胎盘球蛋白
37. 超声雾化吸入的正确操作步骤是
- A. 水槽内加温水
 - B. 药液用温水稀释后放入雾化罐
 - C. 先开雾化开关，再开电源开关
 - D. 添加药液不必关机
 - E. 停用时先关电源开关
38. 为患者稀释痰液作雾化吸入，药物首选
- A. 卡那霉素
 - B. 地塞米松
 - C. α -糜蛋白酶
 - D. 氨茶碱
 - E. 舒喘灵
39. 需要专人负责、加锁保存并列入交班内容的药物是
- A. 可待因
 - B. 柴胡
 - C. 地西洋
 - D. 硝酸甘油
 - E. 胎盘球蛋白

40. 指导患者服药，错误的方法是
- A. 服铁剂忌饮茶
 - B. 服酸类药物需用吸水管吸入
 - C. 服止咳糖浆后不宜饮水
 - D. 助消化药饭前服
 - E. 对胃有刺激的药物饭后服
41. 易氧化和遇光变质须装在有色密盖瓶中保存的药物是
- A. 糖衣片
 - B. 巴比妥
 - C. 地西洋
 - D. 氨茶碱
 - E. 胃复安
42. 执行给药原则中，首要的是
- A. 遵医嘱给药
 - B. 给药途径要准确
 - C. 给药时间要准确
 - D. 注意用药不良反应
 - E. 给药中要经常观察疗效
43. 不符合取药操作要求的是
- A. 取固体药用药匙
 - B. 取水剂药液前将药液摇匀
 - C. 药液量不足 1 mL，用滴管吸取
 - D. 油剂药液滴入杯内后加入适量冷开水
 - E. 患者个人专用药不可互相借用
44. 发口服药不符合要求的是
- A. 根据医嘱给药
 - B. 做好心理护理
 - C. 鼻饲患者暂缓发药
 - D. 患者提出疑问须重新核对
 - E. 危重患者要喂服
45. 下列哪类药物服用后须多饮水
- A. 铁剂
 - B. 止咳糖浆
 - C. 助消化药
 - D. 健胃药

E. 磺胺类药

46. 使用超声波雾化吸入器，水槽内应加

A. 冷蒸馏水

B. 自来水

C. 温水

D. 热水

E. 5%葡萄糖溶液

47. 氧气雾化吸入时下述步骤哪项不妥

A. 严格执行查对制度及消毒隔离制度

B. 常用的氧气雾化吸入器为射流式雾化器

C. 湿化瓶内不能放水

D. 嘱患者紧闭口唇深吸气，呼气用鼻

E. 氧流量用 6~10 L/min

48. 以下哪种情况禁做青霉素过敏试验

A. 从未用过青霉素

B. 直系亲属对青霉素过敏

C. 曾用过青霉素现已停药 5 天

D. 有对青霉素过敏史者

E. 对磺胺类药物过敏者

49. 用皮内注射法接种卡介苗。正确的步骤是

A. 注射前不需消毒注射部位皮肤

B. 进针部位在前臂掌侧上段

C. 进针时针头与皮肤呈 5°角

D. 注入药物前要抽回血

E. 拔针后用干棉签轻压针刺处

50. 下列皮试液 1 mL 含量错误的是

A. 青霉素：500 U

B. 链霉素：2500 U

C. 破伤风抗毒素：150 IU

D. 细胞色素 C：7.5 mg

E. 普鲁卡因：2.5 mg

51. 不符合破伤风抗毒素皮试结果阳性的表现是

A. 局部皮丘红肿扩大

B. 硬结直径为 1 cm

C. 红晕大于 4 cm

- D. 皮丘周围有伪足、痒感
 - E. 患者出现气促、发绀、荨麻疹
52. 应用饮水管吸取的口服药液是

- A. 稀盐酸
- B. 止咳糖浆
- C. 磺胺合剂
- D. 颠茄合剂
- E. 胃蛋白酶合剂

53. 用皮内注射法做药物过敏试验, 不正确的是

- A. 详细询问有无过敏史, 有过敏史者不能做
- B. 前臂掌侧下段皮肤用 2% 碘酊消毒后, 70% 乙醇脱碘后待

干

- C. 针头斜面向上穿刺进皮内
- D. 推注药液 0.1 mL, 局部形成圆形皮丘
- E. 拔出针头, 切勿按揉

54. 不属于血管扩张药的是

- A. 硝普钠
- B. 硝酸甘油
- C. 尼莫地平
- D. 利多卡因
- E. 酚妥拉明

55. 宜饭前服用的药物是

- A. 阿奇霉素
- B. 氨茶碱
- C. 阿司匹林
- D. 维生素 C
- E. 咪替丁

56. 需避光使用的药物

- A. 垂体后叶素
- B. 尼可刹米
- C. 硝普钠
- D. 脂肪乳
- E. 复方氨基酸

二、A2

1. 肌内注射法不适宜的部位是

- A. 臀大肌
- B. 臀中肌
- C. 上臂三角肌
- D. 下后锯肌
- E. 股外侧肌

2. 地点：病房。人物：护士和患者。主题：输液。林护士问：“您好！是吴琳吗？医生嘱咐我给您进行静脉输液，药物是头孢呋辛钠 2.0 g。请问您既往有过敏史吗？”请问此情景中，针对三查七对的原则，遗漏的“七对”内容有几项

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

3. 患者，男性，23 岁。在工地上被铁钉扎伤就诊，医嘱破伤风抗毒素皮试，皮试结果阳性，拟进行脱敏注射，方法为

- A. 分 2 次肌内注射
- B. 分 4 次肌内注射
- C. 分 2 次平均稀释肌内注射
- D. 分 4 次平均稀释肌内注射
- E. 分 4 次逐渐增量稀释肌内注射

4. 患者，女性，30 岁。因肠结核入院。医嘱：链霉素 1 g，im，qd。皮肤过敏试验结果为阳性，此时护士的处置不正确的是

- A. 建议医生修改治疗方案
- B. 告知患者链霉素皮试阳性，应慎用
- C. 注射链霉素前给予葡萄糖酸钙预防过敏
- D. 将结果记录于体温单和医嘱记录单
- E. 列入交班内容

5. 患儿，1 岁 8 个月。上呼吸道感染。医嘱：小儿百服宁 1/4 片，q6 h，prn；头孢唑啉钠，0.25 g，im，每天 2 次。门诊护士为该患儿肌内注射应选择

- A. 臀大肌外上方

B. 臀中肌、臀小肌

C. 三角肌下缘

D. 大腿前外侧

E. 三角肌上缘

6. 孕妇, 33 岁。妊娠 8 周, 有习惯性流产史。遵医嘱给予黄体酮肌肉注射, 护士正确的操作是

A. 碘酒消毒皮肤

B. 消毒范围是 4 cm

C. 选择粗长针头注射

D. 进针角度为 60°

E. 见回血后方可推药

7. 患者, 女性, 27 岁。上呼吸道感染 3 天。患者咳嗽、咳黏痰。医嘱: 超声雾化吸入, tid。护士指导患者做超声雾化吸入时, 操作不妥的是

A. 吸入罐内放药液稀释至 30~50 mL

B. 开机, 先调整定时器, 再调节雾量大小

C. 水温不超过 60°C 不必关机

D. 吸入时间不超过 20 分钟

E. 完毕, 先关雾化开关, 再关电源开关

8. 患者, 女性, 57 岁。心力衰竭伴呼吸道感染, 护士发药时告诉患者, 在所有药物中最后服用的是

A. 地高辛

B. 止咳糖浆

C. 呋塞米

D. 维生素 B

E. 阿莫西林

9. 患者, 男性, 76 岁。诊断为充血性心力衰竭, 服用洋地黄。护士为其发药时需特别注意

A. 核对患者的床号、姓名

B. 叮嘱患者空腹服药

C. 服药前仔细测量患者的脉搏

D. 嘱患者卧床休息, 减少剧烈运动

E. 询问服药后有无不适

10. 患儿, 2 岁。因佝偻病入院。医嘱: 鱼肝油 10 滴, 每日 1 次。护士为患儿配药时, 在药杯中都先加少量温开水, 再加鱼肝

油, 其原因是

- A. 有利于吞服
- B. 减少药量损失
- C. 减少药物毒性
- D. 避免药物挥发
- E. 稀释药物

11. 患者, 男性, 35 岁。患糖尿病, 尿糖(+++)。医嘱: 普通胰岛素(规格为 10 mL, 400 U), 12 U, H。护士应抽取的药液体积是

- A. 0.1 mL
- B. 0.2 mL
- C. 0.3 mL
- D. 0.4 mL
- E. 0.5 mL

12. 患者, 女性, 35 岁。因糖尿病住院治疗。医嘱: 普通胰岛素, 8 U, ac, H。护士应为其执行的时间是

- A. 上午
- B. 饭后
- C. 临睡前
- D. 饭前
- E. 必要时

13. 患儿, 4 岁。毛细支气管炎, 体温 36℃, 脉搏 110 次/分, 呼吸 26 次/分。医嘱: 小儿百服宁 1/4 片 q6 h, prn。“q6 h, prn”的含义是

- A. 长期备用, 每 6 小时 1 次
- B. 临时备用, 每 6 小时 1 次
- C. 长期备用, 每天 6 次
- D. 临时备用, 每天 6 次
- E. 长期备用, 每天 6 时服用

14. 医嘱“安定 5 mg, sos, po”, 护士正确执行该医嘱的方法是

- A. 可执行多次
- B. 需立即执行
- C. 过期尚未执行即失效
- D. 24 小时以内都视为有效

E. 在医生未注明失效时可随时执行

15. 肺结核患者使用链霉素治疗过程中，出现全身麻木抽搐，此时选用治疗的药物是

A. 10%葡萄糖酸钙

B. 0.1%肾上腺素

C. 新斯的明

D. 地塞米松

E. 山梗茶碱

16. 患者，女性，24岁。肺炎，医嘱青霉素治疗。患者在青霉素皮试后2分钟突然出现休克，护士首先应

A. 观察生命体征

B. 应用升压药

C. 让患者平卧

D. 通知医生

E. 给患者吸氧

17. 患者，女性，32岁。不慎割破手指，医嘱TAT肌肉注射，立刻执行。患者行TAT过敏试验结果阳性，正确的做法是

A. 禁用TAT注射

B. 备好抢救物，直接注射TAT

C. 注射肾上腺素等药物抗过敏

D. 采用脱敏疗法注射TAT

E. 再做过敏试验并用生理盐水做对照试验

18. 患者，女性，50岁。因患呼吸系统疾病，需同时服用几种药物，最后服用的药物是

A. 维生素

B. 罗红霉素

C. 维生素B₁

D. 复方甘草口服液

E. 乙酰半胱氨酸胶囊

19. 患者，女性，50岁。上呼吸道感染，医嘱口服磺胺药抗感染。护士嘱其服药后多喝水，目的是

A. 维持血液pH值

B. 增强药物疗效

C. 减轻胃肠道刺激

D. 避免损坏造血系统

E. 加快药物溶解，避免结晶析出

20. 患者，男性，24 岁。结核病，医嘱链霉素治疗。链霉素皮试发生过敏性休克而出现中枢神经系统症状，其原因是

A. 肺水肿

B. 肾衰竭

C. 脑组织缺氧

D. 有效循环血容量锐减

E. 毛细血管扩张，通透性增加

21. 患者，女性，46 岁。因 COPD 需要做雾化吸入，医嘱使用氨茶碱，其目的是

A. 消除炎症

B. 减轻黏膜水肿

C. 解除支气管痉挛

D. 保持呼吸道湿润

E. 稀释痰液使其易于咳出

22. 护士为张某做青霉素过敏试验，20 分钟后观察，其结果是：局部皮丘隆起，出现红晕，直径 1.5 cm，应判断为

A. 阳性

B. 弱阳性

C. 强阳性

D. 阴性

E. 假阳性

23. 患者李某，注射青霉素过程中觉头晕、胸闷、面色苍白，查体脉细弱，血压下降。应立即注射的药物是

A. 盐酸肾上腺素

B. 氢化可的松

C. 异丙嗪

D. 去甲肾上腺素

E. 尼可刹米

24. 患者，男性，22 岁。因外伤行破伤风抗毒素过敏试验。20 分钟后结果示局部皮丘红肿，硬结大于 1.5 cm，红晕大于 4 cm，自述有痒感。此时护士采取的正确处理措施是

A. 不能注射破伤风抗毒素

B. 在对侧前臂作对照试验后再注射

C. 将抗毒素稀释后分 4 次注射

D. 将抗毒素分成 3 等份后每 10 分钟注射 1 次

E. 将抗毒素分 4 次逐渐增加剂量注射

25. 患者, 男性, 28 岁。车祸术后常规行沐舒坦(盐酸氨溴索)雾化吸入, 其目的是

A. 解痉

B. 止咳

C. 抗炎

D. 抗过敏

E. 稀释痰液, 促进痰液排出

26. 某冠心病患者将其每日服用的氨氯地平、阿司匹林、舒降之、硝酸甘油和心得安放置在透明的塑料分药盒中, 责任护士发现后立即告知患者有一种药物不宜放入盒中, 这种药是

A. 氨氯地平

B. 阿司匹林

C. 舒降之

D. 硝酸甘油

E. 心得安

27. 患儿, 女, 3 岁。半年来“感冒”反复发作, 家长多次自行给予“阿司匹林”、“头孢拉定”、“阿莫西林”、“罗红霉素”等药物治疗。5 天前患金黄色葡萄球菌肠炎入院。出院时护士对家长进行健康指导应特别强调

A. 合理喂养

B. 注意饮食卫生

C. 多进行户外活动

D. 注意儿童个人卫生

E. 滥用抗生素的严重后果

三、A3/A4

1. 患者, 男性, 32 岁。诊断为急性扁桃体炎。医嘱: 青霉素过敏试验阴性后, 肌内注射 160 万 U 青霉素。

(1) 护士在问诊患者近期是否使用过青霉素时, 得到哪种答复时需要再次做青霉素皮试

A. 已进行青霉素治疗, 停药 6 小时

B. 已进行青霉素治疗, 停药 12 小时

C. 已进行青霉素治疗, 停药 24 小时

D. 已进行青霉素治疗, 停药 3 天

E. 曾有过青霉素过敏史

答案:

A1:

1-5 CCEBE 6-10CACBE

11-15 CECBE 16-20 BADEE

21-25 CCECE 26-30 CDBAD

31-35 EBCAE 36-40 EDCAD

41-45 DADCE 46-50 EAEDC

51-56 BABDDC

A2:

1-5 DCECB 6-10 CCBCB

11-15 CDACA 16-20CDDEC

21-27 CAAEEDE

A3:

(1)D (2)D