

## 第七章(第三节 考点实战演练)

### A1 型选择题

1. 引起夏季(5~8月份)腹泻的常见病原体( )
  - A. 致病性大肠埃希菌
  - B. 金黄色葡萄糖球菌
  - C. 轮状病毒
  - D. 柯萨奇病毒
  - E. 空肠弯曲菌
2. 判断脱水性质最有效的辅助检查是( )
  - A. 测量体重
  - B. 尿量
  - C. 血钠浓度
  - D. 血钾浓度
  - E. 二氧化碳结合力
3. 不属于轮状病毒肠炎特点的是( )
  - A. 多见于6个月至2岁小儿
  - B. 多见于秋季
  - C. 常伴有上呼吸道感染
  - D. 全身中毒症状不明显
  - E. 大便有腥臭味
4. 有助于维护和修复小儿肠道黏膜屏障功能的药物是( )
  - A. 青霉素
  - B. 黄连素
  - C. 制霉菌素
  - D. 蒙脱石散
  - E. 双歧杆菌
5. 10月龄患儿患病毒性肠炎入院,不宜进食的食物有( )
  - A. 母乳
  - B. 纯牛乳

- C. 发酵乳
- D. 去乳糖配方乳
- E. 豆制代乳品
- 6. 关于小儿腹泻的护理措施, 错误的是( )
  - A. 母乳喂养者继续哺母乳, 暂停辅食
  - B. 人工喂养者暂停牛奶和其他辅食, 继续进食
  - C. 选用清洁、柔软的塑料尿布包裹臀部
  - D. 输液后有尿时即可开始静脉补钾
  - E. 及时更换潮湿衣被, 做好口腔及皮肤护理
- 7. 患儿因腹泻就诊, 体检发现肛周皮肤涨红、皮疹, 除保持臀部清洁外, 局部可涂( )
  - A. 植物油
  - B. 鱼肝油
  - C. 氧化锌软膏
  - D. 克霉唑
  - E. 呋锌油

## A2 型选择题

- 8. 患儿, 男, 9 月龄。腹泻 2 天。大便 15~16 次/天, 蛋花汤样。判断患儿脱水程度的评估指标不包括( )
  - A. 精神状态
  - B. 尿量
  - C. 肠鸣音
  - D. 皮肤弹性
  - E. 前囟
- 9. 患儿, 9 月龄。呕吐, 腹泻 3 天, 尿量略少, 皮肤弹性稍差, 口唇微干, 眼窝轻度凹陷, 血清钠浓度为 140 mmol/L。该患儿的失水量约占体重的( )
  - A. 4%
  - B. 8%
  - C. 10%
  - D. 12%
  - E. 14%
- 10. 某患者因腹泻、呕吐入院。心电图: ST 段水平压低, T 波倒置, U 波增高。最可能的病因是( )

- A. 高钾血症
- B. 低钾血症
- C. 高钙血症
- D. 洋地黄效应
- E. 洋地黄中毒

11. 患儿，男，11月龄。10月份因发热、呕吐、腹泻入院。大便为黄色蛋花汤样，每天10余次，量多，无腥臭味，前囟、眼窝稍凹陷，尿量减少，大便镜检(-)。对该患儿的治疗不恰当的是( )

- A. 及时足量使用广谱抗生素
- B. 补液
- C. 补钾
- D. 应用双歧杆菌
- E. 应用蒙脱石散

12. 患儿，男，1岁。腹泻、发热、呕吐3天入院。遵医嘱禁食。请问该患者目前禁食的时间是( )

- A. 4~6小时
- B. 6~8小时
- C. 8~10小时
- D. 10~12小时
- E. 12~24小时

13. 患儿，女，3月龄。轻型腹泻。家长反映给患儿清洁臀部时患儿哭闹明显。护士进行健康评估时要特别注意患儿的( )

- A. 体温
- B. 呼吸
- C. 尿量
- D. 肛周皮肤
- E. 每天大便次数

14. 患儿，女，11月龄。腹泻6天，每日4~5次，为黄色稀水便，有黏液及脓血。查体：T 39℃，皮肤弹性尚可，心肺功能正常。大便镜检可见大量红、白细胞。家长情绪紧张，担心愈后。护士对其家长进行心理指导，最佳的做法是( )

- A. 介绍促进1岁小儿智力发育的游戏
- B. 说明可治愈，不会留下后遗症

- C. 强调本病没有传染性
- D. 介绍预防腹泻的方法
- E. 介绍本病的病因及治疗措施

15. 某腹泻患儿准备出院，护士给家长进行饮食指导后，患儿母亲的回答错误的是( )

- A. 食物新鲜，食具清洁
- B. 孩子饭前便后应洗手
- C. 继续给孩子母乳喂养，暂停辅食
- D. 多给孩子吃点脂肪丰富的食物
- E. 气候变化时避免孩子腹部受凉

### A3/A4 型选择题

(16~17 题共用题干)

患儿，男，8 月龄。体重 8 kg，因严重腹泻入院治疗。医嘱：0.9%氯化钠注射液静脉滴注，输液速度为 20ml/(kg·h)

16. 护士每小时应为患儿输入的液体量是( )

- A. 140 mL
- B. 160 mL
- C. 180 ml
- D. 200 mL
- E. 240 mL

17. 患儿情绪稳定后，护士在日常护理过程中，错误的措施是( )

- A. 详细记录出入液体量
- B. 加强臀部护理
- C. 腹胀时注意观察有无低钾血症
- D. 如再次发作急性腹泻，应尽早使用止泻剂
- E. 若患儿呕吐，应禁食、补液

(18~19 题共用题干)

患儿，女，6 个月。因呕吐、腹泻 2 天伴口渴。尿少 12 小时入院。门诊以婴儿腹泻伴脱水入院。体格检查：精神萎靡、表情淡漠、前囟极度凹陷、皮肤弹性极差、呼吸深快口唇樱桃红色。

18. 该患儿呼吸深快是由于下列哪种因素引起( )

- A. 低血糖
- B. 代谢性酸中毒

- C. 低钾血症
- D. 低钙血症
- E. 高钾血症

19. 经补液后患儿脱水症状基本消失，但突然出现惊厥，应考虑为( )

- A. 低血糖
- B. 代谢性酸中毒
- C. 低钾血症
- D. 低钙血症
- E. 高钾血症

(20~23 题共用干)

患儿，女，11 月龄。腹泻 3 天。大便为蛋花汤样，带黏液，无腥臭味。无尿 8 小时，眼窝凹陷极明显。血钠 125 mmol/L。诊断为小儿秋季腹泻。

21. 该患儿感染的病原体主要是( )

- A. 变形杆菌
- B. 柯萨奇病毒
- C. 轮状病毒
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 致病性大肠埃希菌

22. 患儿脱水的程度和性质是( )

- A. 中度低渗性脱水
- B. 中度等渗性脱水
- C. 重度等渗性脱水
- D. 重度低渗性脱水
- E. 重度高渗性脱水

23. 护士晨起观察到患儿出现四肢厥冷、脉弱、血压下降的情况，提示可能出现了( )

- A. 贫血
- B. 休克
- C. 低钾血症
- D. 低钙血症
- E. 继发感染

24. 首要的处理措施是( )

- A. 利尿

- B. 记出入量
- C. 静脉补液
- D. 限制饮食
- E. 应用抗生素

## 参考答案

1. A 2. C 3. E 4. D 5. B 6. C 7. C 8. C  
9. A 10. B 11. A 12. A 13. D 14. B 15. D  
16. B 17. D 18. B 19. D 20. C 21. D  
22. B 23. C