第三章(第五节 考点实战演练)

A1 型选择题

1. 新生儿时期应预防接种的疫苗是( )
  - A. 乙肝疫苗、乙脑疫苗
  - B. 麻疹疫苗、卡介苗
  - C. 卡介苗、乙肝疫苗
  - D. 百白破疫苗、脊髓灰质炎疫苗
  - E. 脊髓灰质炎疫苗、乙脑疫苗
2. 接种卡介苗时, 护士常选用的注射部位是( )
  - A. 三角肌下缘
  - B. 大腿外侧
  - C. 大腿前侧
  - D. 腹部
  - E. 背部
3. 脊髓灰质炎疫苗属于( )
  - A. 灭活疫苗
  - B. 减毒活疫苗
  - C. 类毒素疫苗
  - D. 组分疫苗
  - E. 基因工程疫苗
4. 给婴儿口服脊髓灰质炎减毒活疫苗时, 正确的做法是( )
  - A. 用温热水送服
  - B. 用热开水送服
  - C. 冷开水送服或含服
  - D. 热开水溶解后服用
  - E. 服后半小时可饮用热牛奶
5. 属于疫苗接种异常反应的是( )
  - A. 心因性反应
  - B. 偶合发病
  - C. 原有疾病加重

- D. 一般反应
- E. 变态反应

A2 型选择题

6. 小儿，男，4月龄。根据小儿保健疫苗接种计划需接种( )
- A. 卡介苗第1次
  - B. 脊灰疫苗第2次
  - C. 百白破第1次
  - D. 乙肝第1次
  - E. 百白破第2次
7. 某6月龄婴儿，父母带其到儿童保健门诊进行预防接种。此时应对该婴儿注射的疫苗是( )
- A. 百白破疫苗
  - B. 乙肝疫苗
  - C. 卡介苗
  - D. 麻腮风疫苗
  - E. 脊髓灰质炎疫苗
8. 8个月男婴，在社区准备接种麻疹疫苗，护士在为其消毒时，应采用的消毒剂是( )
- A. 2%碘酊
  - B. 0.5%碘伏
  - C. 0.9%生理盐水
  - D. 75%乙醇
  - E. 90%乙醇
9. 患儿，女，6岁。按计划免疫程序来院接种流脑疫苗。护士进行健康评估时得知该女孩尚未吃早餐。此时正确的处理是( )
- A. 按医嘱给予肌肉注射流脑疫苗
  - B. 注意评估近期有无发热感染
  - C. 按医嘱给予皮下注射流脑疫苗
  - D. 按医嘱给予口服流脑疫苗
  - E. 建议吃早餐后再来接种
10. 患儿，男，28天，因“睡眠中发生上下肢短暂性强直性痉挛，伴神志不清2周”来诊。脑CT：脑室缺氧缺血性低密度阴影，

初次发病，护士应向家长解释，该患儿今后不可以接种的疫苗是（ ）

- A. 卡介苗
- B. 乙肝疫苗
- C. 甲肝疫苗
- D. 麻疹疫苗
- E. 百白破三联疫苗

A3/A4 型选择题

(11~14 题共用题干)

患儿，女，3 个月。母亲带其去儿童保健门诊接种百白破混合制剂。

11. 接种前，护士应询问的内容不包括（ ）

- A. 家族史
- B. 疾病史
- C. 过敏史
- D. 目前健康状况
- E. 接种史

12. 接种结束后，错误的健康指导是（ ）

- A. 可以立即回家
- B. 多饮水
- C. 多休息
- D. 饮食不需忌口
- E. 观察接种后反应

13. 接种后，小儿出现烦躁不安、面色苍白、四肢湿冷、脉搏细速等症状，最可能发生了（ ）

- A. 低血压
- B. 过敏性休克
- C. 全身反应
- D. 全身感染
- E. 低血糖

14. 患者母亲非常焦虑，不停哭泣。针对患者母亲的心理护理，错误的是（ ）

- A. 告诉其患儿目前的状况
- B. 告诉其当前采取的措施及原因

- C. 告诉其不可陪伴患儿，以免交叉感染
  - D. 告知其以往类似情况的处理效果
  - E. 帮助其选择缓解焦虑情绪的方法
- (王雷萍)

参考答案

1. C 2. A 3. B 4. C 5. E 6. E 7. B 8. D
9. E 10. E 11. A 12. A 13. B. 14. C