

第九章(第二节 考点实战演练)

A1 型选择题

1. 属于青紫型先天性心脏病的是()
 - A. 法洛四联症
 - B. 室间隔缺损
 - C. 动脉导管未闭
 - D. 房间隔缺损
 - E. 主动脉缩窄
2. 最常见的先天性心脏病是()
 - A. 动脉导管未闭
 - B. 室间隔缺损
 - C. 房间隔缺损
 - D. 法洛四联症
 - E. 肺动脉狭窄
3. 室间隔缺损患儿在剧烈哭闹屏气时,可出现暂时性青紫的原因是()
 - A. 右心衰竭
 - B. 主动脉高压
 - C. 左心衰竭
 - D. 肺动脉高压
 - E. 肺动脉狭窄
4. 关于小儿动脉导管未闭的叙述,正确的是()
 - A. 胸骨左缘第3~4肋间闻及3/6级收缩期杂音
 - B. 主要表现为全身青紫
 - C. 易并发脑血栓
 - D. 出现水冲脉,指甲床毛细血管搏动
 - E. X线检查:右心房及右心室增大为主
5. 常伴有杵状指的先天性心脏病是()
 - A. 室间隔缺损
 - B. 房间隔缺损
 - C. 动脉导管未闭

- D. 法洛四联症
E. 风湿性心脏病
6. 法洛四联症患儿缺氧发作时, 使用普萘洛尔(心得安)进行治疗的目的是()
- A. 控制惊厥
B. 减慢心率
C. 减少水钠潴留
D. 抑制呼吸中枢
E. 纠正代谢性酸中毒
7. 关于先天性心脏病儿童个性心理特征表现的叙述, 错误的是()
- A. 性格内向
B. 情绪不稳
C. 依赖心理增强
D. 明显的恐惧感
E. 记忆力强
8. 为防止先天性心脏病患儿发生血管栓塞, 出现高热时应采取的护理措施是()
- A. 绝对卧床休息
B. 多喝水或静脉补液
C. 吸氧
D. 减少活动量
E. 避免哭闹

A2 型选择题

9. 患儿, 男, 3 岁。体格检查: 胸骨左缘第 2~3 肋间可闻及粗糙的连续性机器样杂音占据整个收缩期和舒张期, 局部可触及震颤。该患儿最可能是()
- A. 室间隔缺损
B. 动脉导管未闭
C. 法洛四联症
D. 主动脉狭窄
E. 房间隔缺损
10. 患儿, 男, 3 岁。出生 4 个月 after 出现发绀, 剧烈哭闹时有抽搐史。发育比同龄儿童稍差, 平时经常感冒。体格检查: 杵状

指，嘴唇发绀明显；心前区闻及 3/6 级收缩期喷射样杂音。X 线胸片提示肺血少，右心室增大。最可能的临床诊断是()

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症
- E. 肺动脉狭窄

11. 患儿，男，3 岁。哭闹时出现口唇发绀，听诊闻及胸骨左缘收缩期杂音，考虑为先天性心脏病。最具有诊断价值的检查是()

- A. 心电图
- B. X 线检查
- C. 超声心动图
- D. 血常规检查
- E. 心肌标志物检查

12. 患儿，女，3 岁。患法洛四联症，心功能 3/6 级。护士建议其家长该患儿最合适的手术时机是()

- A. 立即
- B. 择期
- C. 学龄前
- D. 成年后
- E. 心功能改善后

13. 患儿，男，10 岁。室间隔缺损。拟次日行室间隔缺损修补术。夜间护士巡视病房时发现患儿不肯入睡，哭诉不想手术。此时患儿的主要护理问题是()

- A. 活动无耐力
- B. 营养失调：低于机体需要量
- C. 潜在并发症：心力衰竭
- D. 有感染的危险
- E. 焦虑/恐惧

14. 患儿，女，出生 10 小时。剧烈哭闹时口唇发绀，肋骨左缘第 3~4 肋间闻及全收缩期杂音，肺动脉瓣听诊区第 2 心音亢进，诊断为室间隔缺损。家长情绪紧张焦虑，此时应重点了解的是()

- A. 家庭居住环境

- B. 家庭经济情况
- C. 家长对本病的认识程度
- D. 家长的文化程度
- E. 家长对治疗是否有信心

15. 患儿,女,6个月。室间隔缺损。哭闹时常有口唇发绀。对其饮食护理正确的是()

- A. 勿边喂哺边吸氧
- B. 每餐宜喂饱,以保证营养
- C. 提供低蛋白易消化食物
- D. 喂哺后取仰卧位以利消化
- E. 喂哺过程可暂停,给予休息

16. 患儿男性,6岁。患轻度室间隔缺损,尚未治疗,现因龋齿需拔牙,医生在拔牙前给予抗生素,其目的是预防()

- A. 上呼吸道感染
- B. 牙龈炎
- C. 支气管炎
- D. 充血性心力衰竭
- E. 感染性心内膜炎

17. 患儿,男性,3岁,诊断为法洛四联症。患儿缺氧发作时宜采取的体位是()

- A. 去枕平卧位
- B. 取半坐位
- C. 膝胸卧位
- D. 患儿头肩抬高 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- E. 侧卧位

18. 患儿,女,2岁。法洛四联症。为避免患儿缺氧发作,护士对家长进行健康教育,正确的内容是()

- A. 避免患儿剧烈活动、哭闹、便秘
- B. 给予患儿高蛋白饮食
- C. 患儿需绝对卧床休息
- D. 患儿加强锻炼,增强体质
- E. 患儿需大量饮水

19. 患儿5岁,在门诊诊断为“房间隔缺损”,拟择期手术治疗。门诊护士对患儿亲属的健康教育要点,错误的是()

- A. 本病为一种先天性心脏病

B. 经过治疗，大多数情况下预后良好

C. 治疗方案以手术为主

D. 术前最重要的是防止皮肤破损

E. 术前注意保暖，避免着凉、感冒

20. 患者，女，4岁。出生后即发现心脏有杂音，曾患肺炎3次，剧烈活动后气促有时出现青紫。体格检查：生长发育落后，胸骨左缘3~4肋间闻及4/6级粗糙收缩期杂音对患儿家长进行健康教育时，错误的是()

A. 保证绝对卧床休息

B. 供给充足的营养

C. 预防感冒，及时控制肺炎

D. 适时实施手术治疗

E. 做好保护性隔离，预防感染

21. 患儿，女，2岁。出生时青紫，初步诊断为法洛四联症。近日家长带患儿就诊，准备手术。下列护理措施错误的是()

A. 进一步诊断检查

B. 预防感染

C. 保证睡眠与休息

D. 增加活动量

E. 吸氧

参考答案

1. A 2. B 3. D 4. D 5. D 6. B 7. E 8. B

9. B 10. D 11. C 12. E 13. E 14. C 15. E

16. E 17. C 18. A 19. D 20. A 21. D