

## 第六章(第一节 考点实战演练)

### A1 型选择题

1. 病儿发生营养不良时,皮下脂肪最先消耗的部位是( )
  - A. 躯干
  - B. 臀部
  - C. 腹部
  - D. 四肢
  - E. 面部
2. 苯丙酸诺龙治疗营养不良的主要药理作用是( )
  - A. 促进消化
  - B. 促进机体蛋白质合成
  - C. 降低血糖,增加饥饿感
  - D. 改善味觉
  - E. 清除肠道寄生虫

### A2 型选择题

3. 患儿,女,11个月。因母乳少,以米糊喂养,未添加其他辅食,诊断为营养不良。该患儿最先出现的症状是:( )
  - A. 皮肤干燥
  - B. 肌张力低下
  - C. 体重不增
  - D. 身高低于正常
  - E. 皮下脂肪减少

### A3/A4 型选择题

(5~8 题共用题干)

患儿,女,10月龄。足月产,反复腹泻1个月余,每天5~6次,时稀时稠。出生后混合喂养,未添加辅食。体格检查:意识清,表情呆滞,体重4.8 kg,腹软,腹壁脂肪消失。

4. 应先考虑该患儿为( )

- A. 轻度营养不良, 慢性腹泻
  - B. 中度营养不良, 慢性腹泻
  - C. 重度营养不良, 慢性腹泻
  - D. 中度营养不良, 迁延性腹泻
  - E. 重度营养不良, 迁延性腹泻
5. 患儿变化最为显著的血清学指标是( )
- A. 红细胞计数
  - B. 淋巴细胞计数
  - C. 白细胞计数
  - D. 血清蛋白浓度
  - E. 血红蛋白浓度
6. 关于该患儿的补液原则, 正确的是:( )
- A. 补液总量适量减少, 滴速宜稍慢
  - B. 补液总量适量减少, 滴速宜稍快
  - C. 补液总量适量减少, 保持正常滴速
  - D. 补液总量适量增加, 滴速宜稍慢
  - E. 补液总量适量增加, 保持正常滴速
7. 患儿住院第 2 天晨起突然意识不清, 面色苍白, 脉搏细弱, 呼吸表浅, 出冷汗。首先应静脉注射的是( )
- A. 氨茶碱
  - B. 洛贝林
  - C. 地西洋
  - D. 葡萄糖
  - E. 地高辛

## 参考答案

1. C 2. B 3. C 4. E 5. D 6. A 7. D