

第六章(第二节 考点实战演练)

A1 型选择题

1. 人类维生素 D 的最主要来源是()
 - A. 日光照射皮肤产生
 - B. 食入动物肝脏产生
 - C. 食入蔬菜类提供
 - D. 食入水果类提供
 - E. 食入蛋类提供
2. 维生素 D 缺乏病(佝偻病)的原因不包括()
 - A. 日光照射不足
 - B. 维生素 D 摄入不足
 - C. 生长速度快
 - D. 免疫功能低下
 - E. 疾病与药物的影响
3. 佝偻病初期患儿的临床表现是()
 - A. 颅骨软化
 - B. 下肢畸形
 - C. 有郝氏沟
 - D. 出现枕秃
 - E. 形成鸡胸
4. 佝偻病活动初期的主要表现是()
 - A. 方颅
 - B. 肋骨串珠
 - C. 出牙延迟
 - D. 肌张力低下
 - E. 易激惹、多汗
5. 维生素 D 缺乏性佝偻病的特殊性病变部位是()
 - A. 肌肉
 - B. 血液
 - C. 骨骼
 - D. 大脑

E. 皮肤

6. 3~4 个月的佝偻病患儿可见的体征有()

A. 颅骨软化

B. 方颅

C. 肋膈沟

D. 肋骨串珠

E. O 型腿

7. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症发生喉痉挛多见于()

A. 新生儿

B. 婴儿

C. 幼儿

D. 学龄前儿童

E. 学龄儿童

8. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症惊厥发作时, 下列处理原则哪项是正确的()

A. 立即肌肉注射维生素 D₂ 或维生素 D₃

B. 迅速口服大剂量维生素 D

C. 快速静脉推注 10% 葡萄糖酸钙

D. 缓慢静脉注射 10% 葡萄糖酸钙

E. 大量维生素 D 和钙剂同时使用

A2 型选择题

9. 患儿, 男, 4 月龄。近 1 个月来烦躁, 夜间啼哭, 睡眠不安, 易惊醒, 汗多, 吃奶少, 大便稀, 每天 2~3 次。出生后一直牛奶喂养。引起其睡眠不安最可能的原因是()

A. 生活环境不良

B. 缺少母乳喂养

C. 父母日常护理不当

D. 缺乏维生素 D

E. 慢性腹泻

10. 患儿 10 个月, 易激惹, 夜间常哭闹、多汗、睡眠不安, 方颅、肋骨串珠。下列护理措施错误的是()

A. 指导合理喂养

B. 操作轻柔以防骨折

C. 多抱患儿到户外晒太阳

D. 添加含维生素 D 的食物

E. 提倡进行站、立锻炼

11. 患儿, 男, 3 个月。因多汗、烦躁易凉、睡眠不安半月余, 诊断为佝偻病初期。护士指导患儿正确的日光照射方法是()

A. 每天在室内关窗晒太阳 1 小时

B. 每天在室内关窗晒太阳 2 小时

C. 每天要保证 30 分钟的户外活动

D. 每天要保证 1~2 小时户外运动

E. 每天要保证 8 小时户外活动

12. 足月新生儿, 生后 2 周。为防止维生素 D 缺乏佝偻病的发生, 应建议每日口服维生素 D 的剂量是()

A. 200 IU

B. 400 IU

C. 1000 IU

D. 1500 IU

E. 2000 IU

13. 患儿, 男, 4 月龄。人工喂养, 近日反复出现发作性呼吸困难, 伴有吸气时喉鸣音, 急诊入院。查血钙 1.7 mmol/L , 其余正常。首先考虑该患儿出现了:()

A. 中毒性肺炎

B. 喉痉挛

C. 气管异物

D. 惊厥

E. 支气管哮喘

14. 患儿, 男, 7 个月, 冬季北方出生, 人工喂养, 平时睡眠不安、多汗, 今日晒太阳后突然出现全身抽搐 5~6 次, 每次 1 分钟左右, 抽搐间期活泼如常, 体温 37.5°C 。护士应首先考虑()

A. 癫痫

B. 低血糖

C. 高热惊厥

D. 维生素 D 缺乏病(佝偻病)

E. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症

15. 患儿男, 3 个月。因惊厥收治入院, 血清钙为 1.7 mmol/L

L, 诊断为维生素 D 缺乏性手足抽搦症。针对该患儿的心理护理, 错误的是()

- A. 解释当前采取的措施及原因
- B. 告诉患儿家长以往相同病例的治疗效果
- C. 解释本病的原因及预后
- D. 告诉母亲不可陪伴患儿, 以防诱发惊厥发作
- E. 告诉该母亲缓解心理压力的方法

16. 患儿, 女, 5 个月。昨日突发惊厥, 两眼上翻, 四肢抽动入院。入院诊断为维生素 D 缺乏性手足搐搦症。入院后再次发生惊厥, 应用镇静药后, 该患儿需要静脉注射钙剂。此时应注意监测患儿的()

- A. 心率
- B. 呼吸
- C. 尿量
- D. 体温
- E. 血压

17. 患儿, 9 月龄。单纯牛乳喂养, 未添加辅食, 因抽搐 2 次入院, 血清 Ca^{2+} 0.8 mmol/L 。诊断维生素 D 缺乏性手足搐搦症。对该患儿护理措施不正确的是()

- A. 惊厥时及时清除口鼻分泌物
- B. 遵医嘱应用镇静药和钙剂
- C. 补充钙剂时应快速静脉推注
- D. 惊厥发作时保护患儿安全
- E. 保持安静, 减少刺激

18. 患儿男, 4 个月。半小时前突发抽搐, 持续数秒后停止, 意识恢复, 活动如常, 体温 36.5°C , 有枕秃, 未出牙, 血钙 1.7 mmol/L 。对该患儿家长的健康教育重点是()

- A. 多饮水保持口腔清洁
- B. 加强锻炼增强免疫力
- C. 添加含铁丰富的食物
- D. 指导患儿多晒太阳
- E. 添加富含叶酸的食物

A3/A4 型选择题

(19~20 题共用题干)

患儿，男，6个月。维生素 D 缺乏性手足搐搦症。今日突然出现双眼上翻、四肢抽动，神志不清。

19. 首选的抗惊厥药物是()

- A. 20%甘露醇静脉注射
- B. 10%葡萄糖酸钙静脉注射
- C. 水合氯醛口服
- D. 维生素 D 肌肉注射
- E. 地西泮缓慢静脉注射

20. 护士在使用上述药物的过程中应着重观察的是()

- A. 血氧饱和度
- B. 呼吸
- C. 心率
- D. 血压
- E. 意识

(唐 谦)

参考答案

1. A 2. D 3. D 4. E 5. C 6. A 7. B 8. D
9. D 10. E 11. D 12. B 13. B 14. E 15. D
16. A 17. C 18. D 19. E 20. B