

第十二章(第二节 考点实战演练)

A1 型选择题

1. 引起新生儿化脓性脑膜炎最常见的病原菌是()
 - A. 脑膜炎奈瑟菌
 - B. 流感嗜血杆菌
 - C. 肺炎链球菌
 - D. 大肠埃希菌
 - E. 铜绿假单胞菌
2. 某化脓性脑膜炎患儿出现烦躁不安, 频繁呕吐, 四肢肌张力明显增高, 双侧瞳孔大小不等, 对光反应迟钝。应高度警惕患儿出现:()
 - A. 惊厥
 - B. 脱水
 - C. 脑疝
 - D. 呼吸衰竭
 - E. 代谢性酸中毒
3. 预防化脓性脑膜炎的健康教育应强调()
 - A. 限制饮水量
 - B. 预防细菌引起的上呼吸道感染
 - C. 预防性使用抗生素
 - D. 监测基础体温
 - E. 限制患者户外活动

A2 型选择题

4. 患儿, 男, 3 岁。因化脓性脑膜炎入院。脑脊液细菌培养显示为脑膜炎双球菌感染, 进行抗感染治疗首选的抗菌药是()
 - A. 青霉素
 - B. 阿奇霉素
 - C. 庆大霉素
 - D. 氯霉素

E. 链霉素

A3/A4 型选择题

(5~6 题共用题干)

患儿，男，5 岁。因发热、头痛 2 天入院。入院后精神萎靡，并出现喷射性呕吐 2 次。查体：T39.5℃，前囟膨隆。脑脊液检查：外观浑浊、压力高。血象：白细胞高，以中性粒细胞为主。

5. 该患儿可能患()

- A. 化脓性脑膜炎
- B. 高热惊厥
- C. 病毒性脑膜炎
- D. 病毒性脑炎
- E. 结核性脑膜炎

6. 针对该患儿采取的护理措施，错误的是()

- A. 保持病室温度在 18℃~22℃，湿度 50%~60%
- B. 体温>38.5℃时给予物理降温
- C. 不能进食者，给予鼻饲
- D. 及时更换潮湿的衣服，脱衣时，先脱患侧再脱健侧
- E. 严密观察患儿生命体征、神智、瞳孔的变化

参考答案

1. D 2. C 3. B 4. A 5. A 6. D