

• 临床指南 •

胎膜早破的诊断与处理指南 (2015)

中华医学会妇产科学分会产科学组

胎膜早破 (premature rupture of membrane, PROM) 是指胎膜在临产前发生自发性破裂, 依据发生的孕周分为足月 PROM 和未足月 PROM (preterm premature rupture of membrane, PPRM)。足月单胎 PROM 发生率为 8%; 单胎妊娠 PPRM 发生率为 2%~4%, 双胎妊娠 PPRM 发生率为 7%~20%, PPRM 是早产的主要原因之一^[1-4]。PROM 的诊治, 尤其是 PPRM 的处理策略, 一直是产科临床工作中的棘手问题。目前, 国内对于不同孕周 PPRM 的处理原则缺乏共识; 对于足月 PROM 短时间内未临产者是否引产及引产方法等问题尚存在争议; 对于 PPRM 期待治疗的处理、保胎期限、如何预防感染、终止妊娠方式等问题尚无统一的指南或规范。

因此, 有必要制订足月 PROM 和 PPRM 的诊断与处理指南。本指南的制订参考了美国妇产科医师协会 (2013 年)、英国皇家妇产科医师学会 (2010 年) 等关于 PROM 的相关指南以及最新的循证医学证据, 并结合了国内的围产现状, 旨在规范和指导 PROM 的诊治。

一、总论

(一) PROM 的病因和高危因素

足月 PROM 与妊娠晚期生理性宫缩所致的胎膜薄弱有一定的关系, 而早产 PROM 更多是由于亚临床绒毛膜羊膜炎所致。具有下述高危因素者更容易发生 PROM (II/B 级)。

1. 母体因素: 反复阴道流血、阴道炎、长期应用糖皮质激素、腹部创伤、腹腔内压力突然增加 (剧烈咳嗽、排便困难)、吸烟、药物滥用、营养不良、

前次妊娠发生早产 PROM 史、妊娠晚期性生活频繁等。

2. 子宫及胎盘因素: 子宫畸形、胎盘早剥、子宫颈机能不全、子宫颈环扎术后、子宫颈锥切术后、子宫颈缩短、先兆早产、子宫过度膨胀 (羊水过多、多胎妊娠)、头盆不称、胎位异常 (臀位、横位)、绒毛膜羊膜炎、亚临床宫内感染等。

(二) PROM 的诊断

1. 临床症状和体征: 孕妇主诉突然出现阴道流液或无控制的“漏尿”, 少数孕妇仅感觉到外阴较平时湿润, 窥阴器检查见混有胎脂的羊水自子宫颈口流出, 即可做出诊断。值得注意的是要应用消毒的窥器进行检查, 并且避免指检以防止上行性感染。

2. 辅助检查: (1) 阴道酸碱度测定: 正常阴道液 pH 值为 4.5~6.0, 羊水 pH 值为 7.0~7.5。胎膜破裂后, 阴道液 pH 值升高 ($\text{pH} \geq 6.5$)。pH 值通常采用硝嗪或石蕊试纸测定, 如果后穹隆有液池, 且试纸变蓝可以明确诊断。但子宫颈炎、阴道炎、血液、肥皂、尿液、精液或防腐剂可能会造成 pH 试纸测定的假阳性^[1-4]。pH 值诊断 PROM 的敏感度为 90%, 假阳性率为 17%^[2] (II/B 级)。(2) 阴道液涂片: 取阴道液涂于玻片上, 干燥后显微镜下观察, 出现羊齿状结晶提示为羊水。精液和宫颈黏液可造成假阳性^[3]。其诊断 PROM 的敏感度为 51%~98%, 假阳性率为 6%^[2]。通常, 在上述检查不能确定 PROM 时使用 (II/B 级)。(3) 生化指标检测: 对于上述检查方法仍难确定的可疑 PROM 孕妇, 可采用生化指标检测。临床应用最多的是胰岛素样生长因子结合蛋白 1 (insulin like growth factor binding protein-1, IGFBP-1) 和胎盘 α 微球蛋白 1 (placental alphamicroglobulin-1, PAMG-1)^[1-6]。但是在有规律宫缩且胎膜完整者中有高达 19%~30% 的假阳性率^[7], 所以主要应用于难确诊且无规律宫缩的可疑 PROM 孕妇 (II/B 级)。

DOI:10.3760/cma.j.issn.0529-567x.2015.01.002

通信作者: 时春艳, 100034 北京大学第一医院妇产科,
Email: shichunyan1996@163.com

原文刊载于:《中华妇产科杂志》2015 年 1 月第 50 卷第 1 期 3-8 页

(4) 超声检查: 对于可疑 PROM 孕妇, 超声检测羊水量可能有一定帮助, 如果超声提示羊水量明显减少, 同时孕妇还有过阴道排液的病史, 在排除其他原因导致的羊水过少的前提下, 应高度怀疑 PROM, 可以结合上述生化指标检测手段诊断 PROM^[1-4]。

(三) 胎膜早破的并发症

1. 足月 PROM 的常见并发症: 足月 PROM 常常是即将临产的先兆, 50% 的孕妇在胎膜破裂后 12 h 内自行临产, 20% 的孕妇在 12~24 h 内临产, 25% 的孕妇在 24~72 h 内临产, 5% 的孕妇 72 h 内仍不能临产^[4]。足月 PROM 的主要并发症是宫内感染^[1]。破膜时间越长, 临床绒毛膜羊膜炎的风险越大, 进而导致母体的产褥感染、新生儿感染、败血症等。

2. PPROM 的常见并发症: PPROM 有 15%~25% 者合并有临床症状的绒毛膜羊膜炎^[1-2]。孕周越早绒毛膜羊膜炎的风险越大。PPROM 最主要的并发症是早产, 由于早产儿不成熟及宫内感染导致的各种并发症, 包括新生儿呼吸窘迫综合征 (respiratory distress syndrome, RDS)、脑室内出血 (intraventricular hemorrhage, IVH) 和坏死性小肠结肠炎 (necrotizing enterocolitis, NEC)、败血症等。经过积极保胎等处理仍有约 50% 的早产 PROM 在破膜后 1 周内分娩, 是早产的主要原因^[1-3]。其他常见的并发症有胎儿窘迫、胎盘早剥。胎膜早破导致羊水过少、脐带受压甚至脐带脱垂, 从而发生胎儿窘迫甚至胎死宫内。PROM 发生后宫腔压力的改变导致约 2%~5% 的 PPROM 者发生胎盘早剥^[1]。

(四) 预防和监测绒毛膜羊膜炎

1. 绒毛膜羊膜炎的诊断和鉴别诊断: 绒毛膜羊膜炎是 PROM 的常见并发症, 互为因果。绒毛膜羊膜炎可以导致母儿不良结局, 应注意识别和预防。破膜时间越长, 绒毛膜羊膜炎的风险越大。急性临床绒毛膜羊膜炎的主要表现为孕妇体温升高 (体温 $\geq 37.8^{\circ}\text{C}$)、脉搏增快 (≥ 100 次/min)、胎心率增快 (≥ 160 次/min)、宫底有压痛、阴道分泌物异味、外周血白细胞计数升高 ($\geq 15 \times 10^9/\text{L}$ 或核左移)。孕妇体温升高的同时伴有上述 2 个或以上的症状或体征可以诊断为临床绒毛膜羊膜炎^[8-9], 但上述任何单项的临床表现或指标异常都不能诊断。单纯一项指标异常应进行相应的鉴别诊断, 并

密切观察和监测。如糖皮质激素的应用会导致白细胞计数的增高; 某些药物或其他情况可以引起孕妇脉搏增快或胎心率增快, 如 β 受体兴奋剂可以导致孕妇脉搏及胎心率增快。产程中硬膜外阻滞的无痛分娩可以引起发热等^[8]。

2. 绒毛膜羊膜炎的监测: 建议每 4~8 小时监测孕妇的体温、脉搏, 按常规和个体情况行血常规的检测和胎心率监测及行胎儿电子监护, 同时严密观察羊水性状、子宫有无压痛等绒毛膜羊膜炎征象, 及早发现和处理绒毛膜羊膜炎。阴道检查可造成阴道内细菌的上行性感染, 可增加绒毛膜羊膜炎及产后子宫内膜炎、胎儿感染及新生儿感染的风险^[1-2], 在期待保胎、引产过程中或产程中应尽量减少不必要的阴道检查 (II /B 级)。

3. 绒毛膜羊膜炎的处理: 临床诊断绒毛膜羊膜炎或可疑绒毛膜羊膜炎时, 应及时应用抗生素^[8-11], 诊断绒毛膜羊膜炎尽快终止妊娠, 不能短时间内阴道分娩者应选择剖宫产术终止妊娠。有条件者胎儿娩出后进行新生儿耳拭子和宫腔分泌物培养及胎盘胎膜送病理检查, 但是有典型的临床感染的症状如果无病理支持并不能否认宫内感染的诊断^[9]。新生儿按高危儿处理 (II /B 级)。

(五) 预防 B 族溶血性链球菌上行性感染

PROM 是 B 族溶血性链球菌 (group B streptococcus, GBS) 上行性感染的高危因素^[1-3,12], 是导致孕妇产时及产褥期感染、胎儿感染及新生儿感染的重要病原菌, 应重视 GBS 感染的防治。这一相关问题也越来越受到国内围产医学界的重视^[13-15]。若之前有过筛查并且 GBS 阳性则在发生胎膜破裂后立即使用抗生素治疗, 若未行 GBS 培养, 足月 PROM 破膜时间 ≥ 18 h 或孕妇体温 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 也应考虑启动抗生素的治疗^[12]。对 PPROM 孕妇有条件者建议行阴道下 1/3 及肛周分泌物的 GBS 培养。GBS 培养阳性者, 即使之前已经应用了广谱抗生素, 一旦临产, 应重新给予抗生素治疗^[12,16]。青霉素为首选药物, 如果青霉素过敏则用头孢菌素类抗生素或红霉素^[1-2,12,16]。预防 GBS 感染的抗生素用法: (1) 青霉素 G 首次剂量 480 万单位静脉滴注, 然后 240 万单位 /4 h 直至分娩; 或氨苄青霉素, 负荷量 2 g 静脉滴注, 然后每 4 小时 1 g 的剂量静脉滴注直至分娩。(2) 对青霉素过敏者则选用头孢唑啉, 以 2 g 作为起始剂量静脉滴注, 然后每 8 小时 1 g 直至分娩。(3) 对头孢菌素类过敏者则用红霉

素 500 mg, 每 6 小时 1 次静脉滴注; 或克林霉素 900 mg 静脉滴注, 每 8 小时 1 次^[12]。

二、足月 PROM 的处理

(一) 足月 PROM 孕妇宜适时引产

足月 PROM 明确诊断后, 应评估母胎状况, 排除胎儿窘迫、绒毛膜羊膜炎、胎盘早剥、胎位异常、母体合并症等。随着破膜时间延长, 宫内感染的风险显著增加^[1-3]。无剖宫产指征者破膜后 2~12 h 内积极引产可以显著缩短破膜至分娩的时间, 并且显著降低绒毛膜羊膜炎及母体产褥感染的风险, 而不增加剖宫产率和阴道助产率及其他不良妊娠结局的发生率^[17-19]; 孕妇接受度也高于给予期待治疗的对照孕妇, 但积极引产者与期待者的新生儿感染率并无显著差异, 其研究对象 41% 为经产妇, 59% 为初产妇^[18]。国内主要基于初产妇的回顾性研究结果显示, 延迟至破膜后 24 h 如果不临产再引产则显著增加新生儿感染率和剖宫产率^[20]。足月 PROM 孕妇在短时间内不临产者在经积极引产后更有利于获得良好的母儿结局^[17-21]。如无明确剖宫产指征, 则宜在破膜后 2~12 h 内积极引产。良好的规律宫缩引产至少 12~18 h 如仍在潜伏期阶段才可考虑诊断引产失败行剖宫产分娩^[22]。对于拒绝引产者应充分告知期待治疗可能会增加母儿感染风险(Ⅱ/B 级)。

(二) 引产方法

对于子宫颈条件成熟的足月 PROM 孕妇, 行缩宫素静脉滴注是首选的引产方法^[1]。引产过程中应遵循引产规范^[23-24]; 对于子宫颈条件不成熟且无促宫颈成熟及阴道分娩禁忌证者, 可应用前列腺素制剂以促进子宫颈成熟^[1,17,24-27], 但要注意预防感染^[1]。使用前列腺素类药物改善子宫颈条件时应注意产科的相关规范, 密切监测宫缩情况和胎儿情况, 若发生宫缩过频或胎儿窘迫征象应及时取出药物, 必要时应用宫缩抑制剂^[23-27](Ⅱ/B 级)。

三、PPROM 的评估和处理

根据孕周大小可将 PPROM 分为无生机的 PPROM (< 24 孕周), 远离足月的 PPROM (孕 24~31⁺6 周), 近足月的 PPROM (孕 32~36⁺6 周)^[1]。远离足月的 PPROM (孕 24~31⁺6 周), 按照我国情况可以分为孕 24~27⁺6 周和 28~31⁺6 周, 近足月的 PPROM 又分为孕 32~33⁺6 周和孕 34~36⁺6 周。

(一) PPROM 处理总则


1. 对孕妇和胎儿状况进行全面评估: (1) 准确核对孕周: 依据月经周期、受孕时间、早中孕期

超声测量数据等。(2) 评估有无感染。(3) 评估胎儿状况: 胎儿大小、胎方位、羊水指数、有无胎儿窘迫; 有无胎儿畸形。(4) 评估母体有无其他合并症或并发症, 如胎盘早剥等。

2. 确定处理方案: 依据孕周、母胎状况、当地的医疗水平及孕妇和家属意愿 4 个方面进行决策: 放弃胎儿, 终止妊娠; 期待保胎治疗; 如果终止妊娠的益处大于期待延长孕周, 则积极引产或有指征时剖宫产术分娩^[1-4]。(1) 立即终止妊娠放弃胎儿: ①孕周 < 24 周: 为无生机儿阶段, 由于需期待数周才能获得生存可能, 早产儿不良结局发生率较高, 且母儿感染风险大, 多不主张继续妊娠, 以引产为宜^[1]。②孕 24~27⁺6 周者要求引产放弃胎儿者, 我国仍然采用 ≥ 28 孕周才算进入围产期, 孕 24~27⁺6 周尚未进入围产期者, 可以依据孕妇本人及家属的意愿终止妊娠。(2) 期待保胎: ①孕 24~27⁺6 周符合保胎条件同时孕妇及家人要求保胎者; 但保胎过程长, 风险大, 要充分告知期待保胎过程中的风险。但如果已经羊水过少, 羊水最大深度 < 20 mm 宜考虑终止妊娠。②孕 28~33⁺6 周无继续妊娠禁忌, 应保胎、延长孕周至 34 周, 保胎过程中给予糖皮质激素和抗生素治疗, 密切监测母胎状况。(3) 不宜继续保胎采用引产或剖宫产终止妊娠: ①孕 34~36⁺6 周, 已接近足月者, 90% 以上的胎儿肺已经成熟, 新生儿发生 RDS 的概率显著下降, 早产儿的存活率接近足月儿, 则不宜保胎^[1-4]; 虽然从新生儿感染的结局方面当前尚无充分证据证明积极引产可显著减少新生儿严重感染的发生率^[28], 但是积极引产可以减少绒毛膜羊膜炎、羊水过少、胎儿窘迫等导致的新生儿不良结局^[1-3](Ⅱ/B 级)。孕 34~34⁺6 周由于有约 5% 以上的新生儿会发生 RDS^[1-2], 目前, 国内外学术界对于是否延长孕周至 35 周尚无统一的意见^[1,28], 建议依据孕妇本人状况和意愿及当地医疗水平决定是否期待保胎, 但要告之延长孕周有增加绒毛膜羊膜炎等发生的风险^[1,29-30]。②无论任何孕周, 明确诊断的宫内感染、明确诊断的胎儿窘迫、胎盘早剥等不宜继续妊娠者。PPROM 的处理流程见图 1。

(二) 期待保胎过程中的处理

1. 促胎肺成熟: 产前应用糖皮质激素促胎肺成熟能减少新生儿 RDS、IVH、NEC 的发生, 且不会增加母儿感染的风险^[31](Ⅰ/A 级)。(1) 应



注: PPROM: 未足月胎膜早破 (preterm premature rupture of membrane); GBS: B 族溶血性链球菌 (group B streptococcus)

图 1 PPROM 处理流程

用指征: < 34 孕周无期待保胎治疗禁忌证者, 均应给予糖皮质激素治疗^[1-4,31-32]。但孕 26 周前给予糖皮质激素的效果不肯定, 建议达孕 26 周后再给予糖皮质激素^[33]。≥ 34 孕周分娩的新生儿中, 仍有 5% 以上的新生儿 RDS 发生率, 鉴于我国当前围产医学状况和最近中华医学会妇产科学分会产科学组制订的早产指南^[34], 建议对孕 34~34⁺6 周的 PPROM 孕妇, 依据其个体情况和当地的医疗水平来决定是否给予促胎肺成熟的处理, 但如果孕妇合并妊娠期糖尿病, 建议进行促胎肺成熟处理。(2) 具体用法: 地塞米松 6 mg 孕妇肌肉注射 (国内常用剂量为 5 mg), 每 12 小时 1 次, 共 4 次, 或倍他米松 12 mg 孕妇肌肉注射, 每天 1 次, 共 2 次。给予首剂后, 24~48 h 内起效并能持续发挥作用至少 7 d。即使估计不能完成 1 个疗程的孕妇也建议使用, 能有一定的作用, 但不宜缩短使用间隔时间^[31-34]。孕 32 周前使用了单疗程糖皮质激素治疗, 孕妇尚未分娩, 在应用 1 个疗程 2 周后, 孕周仍不足 32⁺6 周, 估计短期内终止妊娠者可再次应用 1 个疗程, 但总疗程不能超过 2 次^[32,34]。对于糖尿病合并妊娠或妊娠期糖尿病孕妇处理上无特殊, 但要注意监测血糖水平, 防止血糖过高而引起酮症。

2. 抗生素的应用: 导致 PPROM 的主要原因是感染, 多数为亚临床感染, 30%~50% 的 PPROM 羊膜腔内可以找到感染的证据^[35-36]。即使当时没有感染, 在期待保胎过程中也因破膜容易发生上行性感染。对于 PPROM 预防性应用抗生素的价值是肯定的, 可有效延长 PPROM 的潜伏期, 减少绒毛膜羊膜炎的发生率, 降低破膜后 48 h 内和 7 d 内的分

娩率, 降低新生儿感染率以及新生儿头颅超声检查的异常率^[37-39] (I / A 级)。

具体应用方法: 美国妇产科医师协会推荐的有循证医学证据的有效抗生素, 主要为氨苄青霉素联合红霉素静脉滴注 48 h, 其后改为口服阿莫西林联合肠溶红霉素连续 5 d^[1,37-39]。具体用量为, 氨苄青霉素 2 g + 红霉素 250 mg 每 6 小时 1 次静脉点滴 48 h, 阿莫西林 250 mg 联合肠溶红霉素 333 mg 每 8 小时 1 次口服连续 5 d。青霉素过敏的孕妇, 可单独口服红霉素 10 d^[2]。应避免使用氨苄青霉素 + 克拉维酸钾类抗生素, 因其有增加新生儿 NEC 的风险^[1,37]。但由于我

国抗生素耐药非常严重, 在参考美国妇产科医师协会推荐的抗生素方案的前提下要依据个体情况选择用药和方案。

3. 宫缩抑制剂的使用: PROM 发生后会出现不同程度的宫缩, PPROM 引起的宫缩多与亚临床感染诱发前列腺素大量合成及分泌有关。如果有规律宫缩, 建议应用宫缩抑制剂 48 h, 完成糖皮质激素促胎肺成熟的处理, 减少新生儿 RDS 的发生, 或及时转诊至有新生儿重症监护病房的医院。完成上述处理后, 如果仍有规律宫缩应重新评估绒毛膜羊膜炎和胎盘早剥的风险, 如有明确感染或已经进入产程不宜再继续保胎, 临产者应用宫缩抑制剂不能延长孕周^[1-3,40-41]。此外, 长时间使用宫缩抑制剂对于 PPROM 者不利于母婴结局^[41] (II / B 级)。

随机对照研究提示孕 32 周前有分娩风险孕妇应用硫酸镁可以降低存活儿的脑性瘫痪发生率^[1]。所以对于孕周 < 32 周的 PPROM 孕妇, 有随时分娩风险者可考虑应用硫酸镁保护胎儿神经系统, 但无统一方案^[1]。

常用的宫缩抑制剂有 β 受体兴奋剂、前列腺素合成酶抑制剂、钙离子拮抗剂、缩宫素受体拮抗剂等。个体化选择宫缩抑制剂, 同时应注意对孕妇及胎儿带来的不良反应^[34]。

4. 期待过程中的监测: 保守期待治疗时高臀位卧床休息, 避免不必要的肛查和阴道检查, 动态监测羊水量、胎儿情况、有无胎盘早剥及定期监测绒毛膜羊膜炎和临产的征象。当前没有对于监测的最佳频率达成共识, 目前的监测手段包括定期超声监测胎儿生长和羊水量、胎心监护、及感染指标的检

测, 保胎时间长者可以考虑行宫颈分泌物培养和中段尿培养及时发现绒毛膜羊膜炎。卧床期间应注意预防孕妇卧床过久可能导致的一些并发症, 如血栓形成、肌肉萎缩等。若保守治疗中出现感染、胎儿窘迫、胎盘早剥、羊水持续过少时, 应考虑终止妊娠, 而病情稳定者可期待至孕 ≥ 34 周后终止妊娠^[1-3]。

(三) 分娩方式

PPROM 选择何种分娩方式, 需综合考虑孕周、早产儿存活率、是否存在羊水过少或绒毛膜羊膜炎、胎儿能否耐受宫缩、胎方位等因素。PPROM 不是剖宫产指征, 分娩方式应遵循标准的产科常规, 在无明确的剖宫产指征时应选择阴道试产, 产程中密切注意胎心变化, 有异常情况时放宽剖宫产指征。阴道分娩时不必常规会阴切开, 亦不主张预防性产钳助产。有剖宫产指征时, 应选择剖宫产术分娩为宜; 胎儿臀位时应首选剖宫产术分娩, 但也要注意根据孕周、当地医疗条件权衡^[29-30]。PPROM 胎儿娩出后建议有条件者行胎盘胎膜病理检查, 明确有无组织病理性绒毛膜羊膜炎。对于可疑宫内感染或明确的宫内感染者行羊膜腔和新生儿耳拭子培养。

(四) 其他问题

1. 羊水过少的处理: 羊水指数 < 5 cm 或羊水最大平面垂直深度 < 2 cm 为羊水过少, 是 PPRM 的常见并发症。建议采用羊水平面的最大垂直深度来监测 PPRM 的羊水量。适宜的羊水量是胎儿肺发育的重要条件, 如果在孕 26 周前羊水过少可以导致胎儿肺发育不良; 胎儿变形如 POTTER 面容、肢体挛缩、骨骼变形等。此外, 羊水过少也是绒毛膜羊膜炎和胎儿窘迫的高危因素^[1-2]。但羊膜腔灌注并不能改善妊娠结局^[1-2]。在期待保胎过程中羊膜腔内灌注不能明显改善肺发育不良的发生率^[1-2], 产程中羊膜腔灌注不能显著减少胎儿窘迫的发生率和降低剖宫产率^[1-2]。因此, 不推荐在羊水过少时行羊膜腔灌注^[2]。如果羊水过少, 密切监测有无绒毛膜羊膜炎和胎儿窘迫, 依据情况适时终止妊娠。

2. 能否在家期待保胎: 明确的 PROM 由于难以预测随时发生的病情变化, 不宜在家保胎; 如果高位破膜, 住院观察一段时间后羊水不再流出、超声提示羊水量正常, 无相关并发症, 可以考虑回家, 但要监测体温, 定期产前检查。

3. 子宫环扎术后 PPRM 的处理: 子宫环扎术是 PPRM 的高危因素, 约 38% 发生 PPRM^[42], 如何处理? 是否立即拆线? 也是临床

经常面对的问题。目前, 尚缺乏前瞻性的随机对照研究。回顾性研究发现, 如果保留环扎线可以显著延长孕周 48 h 以上, 但可显著增加孕妇绒毛膜羊膜炎、新生儿感染和新生儿败血症的发生率^[42-43]。因此, 建议个体化处理, 对于孕周 < 24 周的 PPRM 孕妇可拆线放弃胎儿; 孕 24~27⁺6 周的 PPRM, 依据患者的知情同意和个体情况决定是否期待治疗并给予促胎肺成熟; 孕 28~31⁺6 周的 PPRM, 在无禁忌证的前提下促胎肺成熟完成后, 依据个体情况可以考虑拆线或保留; ≥ 32 孕周, 一旦诊断 PROM 后应考虑拆线^[1,43] (II/B 级)。

参与本指南制订及讨论的专家: 漆洪波 (重庆医科大学附属第一医院), 杨慧霞 (北京大学第一医院), 胡娅莉 (南京大学医学院附属鼓楼医院), 刘兴会 (四川大学华西第二医院), 贺晶 (浙江大学医学院附属妇产科医院), 边旭明 (北京协和医院), 范玲 (首都医科大学附属北京妇产医院), 时春艳 (北京大学第一医院)

参与本指南撰写的执笔专家: 时春艳 (北京大学第一医院), 漆洪波 (重庆医科大学附属第一医院), 杨慧霞 (北京大学第一医院)

参 考 文 献

- [1] American College of Obstetricians and Gynecologists. Practice Bulletin No. 139: premature rupture of membranes. Clinical management guidelines for obstetrician-gynecologists[J]. Obstet Gynecol, 2013, 122(4): 918-930.
- [2] Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). Preterm prelabour rupture of membranes (Green-top guideline No. 44) [EB/OL]. (2010) [2014-09-28]. <https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg44pprom28022011.pdf>.
- [3] Di Renzo GC, Roura LC, Facchinetti F, et al. Guidelines for the management of spontaneous preterm labor: identification of spontaneous preterm labor, diagnosis of preterm premature rupture of membranes, and preventive tools for preterm birth[J]. J Matern Fetal Neonatal Med, 2011, 24(5): 659-667.
- [4] Caughey AB, Robinson JN, Norwitz ER. Contemporary diagnosis and management of preterm premature rupture of membranes[J]. Rev Obstet Gynecol, 2008, 1(1): 11-22.
- [5] Erdemoglu E, Mungan T. Significance of detecting insulin-like growth factor binding protein-1 in cervicovaginal secretions: comparison with nitrazine test and amniotic fluid volume assessment[J]. Acta Obstet Gynecol Scand, 2004, 83(7): 622-626.
- [6] Lee SE, Park JS, Norwitz ER, et al. Measurement of placental alpha-microglobulin-1 in cervicovaginal discharge to diagnose rupture of membranes[J]. Obstet Gynecol, 2007, 109(3): 634-640.

- [7] Lee SM, Romero R, Park JW, et al. The clinical significance of a positive Amnisure test in women with preterm labor and intact membranes[J]. *J Matern Fetal Neonatal Med*, 2012,25(9): 1690-1698.
- [8] Tita AT, Andrews WW. Diagnosis and management of clinical chorioamnionitis[J]. *Clin perinatol* 2010,37(2): 339-354.
- [9] 时春艳. 羊膜腔感染的诊断和处理 [J/CD]. *中华产科急救电子杂志*, 2013, 2(1): 33-36.
- [10] Flenady V, King J. Antibiotics for prelabour rupture of membranes at or near term[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2002, (3): CD001807.
- [11] American College of Obstetricians and Gynecologists. Practice Bulletin No. 120: Use of Prophylactic Antibiotics in Labor and Delivery. Clinical management guidelines for obstetrician-gynecologists[J]. *Obstet Gynecol*, 2011, 122(4): 918-930.
- [12] Verani JR, McGee L, Schrag SJ, et al. Prevention of perinatal group B streptococcal disease—revised guidelines from CDC, 2010[J]. *MMWR Recomm Rep*, 2010,59(10):1-36.
- [13] 时春艳, 杨慧霞. B 族溶血性链球菌围产期感染的预防和处理策略 [J]. *中华围产医学杂志*, 2008,11(4):315-318.
- [14] 时春艳, 杨磊, 杨慧霞, 等. 妊娠晚期孕妇 B 族链球菌感染的检测及其对妊娠结局的影响 [J]. *中华妇产科杂志*, 2010, 45(1):12-16.
- [15] 时春艳, 赵扬玉, 范玲, 等. 实时聚合酶链反应方法检测妊娠晚期孕妇 B 族溶血性链球菌的多中心研究 [J]. *中华围产医学杂志*, 2014,17(7):489-492.
- [16] American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Obstetric Practice. ACOG Committee Opinion No. 485: Prevention of early-onset group B streptococcal disease in newborns[J]. *Obstet Gynecol*, 2011,117(4):1019-1027.
- [17] Mozurkewich E, Chilimigras J, Koepke E, et al. Indications for induction of labour: a best-evidence review[J]. *BJOG*, 2009, 116(5): 626-636.
- [18] Hannah ME, Ohlsson A, Farine D, et al. Induction of labor compared with expectant management for prelabor rupture of the membranes at term[J]. *N Engl J Med*, 1996, 334(16): 1005-1010.
- [19] Dare MR, Middleton P, Crowther CA, et al. Planned early birth versus expectant management(waiting)for prelabour rupture of membranes at term(37 weeks or more)[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2006, 25(1): CD005302.
- [20] 郑淑敏, 王允锋, 孙万卉, 等. 足月及近足月胎膜早破临床最佳干预时机的探讨 [J]. *中华围产医学杂志*, 2010, 13(6):398-402.
- [21] Li K, Wang Y, Li H, et al. A study of 579 pregnant women with premature rupture of membranes at term[J]. *Int J Gynecol Obstet*, 2011,112(1):45-47.
- [22] Rouse DJ, Weiner SJ, Bloom SL, et al. Failed labor induction: toward an objective diagnosis. Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development(NICHD) Maternal-Fetal Medicine Units Network (MFMU)[J]. *Obstet Gynecol*, 2011, 117(2 Pt 1):267-272.
- [23] 中华医学会妇产科学分会产科学组. 妊娠晚期促宫颈成熟与引产指南 (草案) [J]. *中华妇产科杂志*, 2008, 43(1): 75-78.
- [24] ACOG Committee on Practice Bulletins -- Obstetrics.ACOG Practice Bulletin No. 107: Induction of labor[J]. *Obstet Gynecol*, 2009, 114(2 Pt 1):386-397.
- [25] Bricker L, Peden H, Tomlinson AJ, et al. Titrated low-dose vaginal and/or misoprostol to induce labour for prelabor membrane rupture: a randomized trial[J]. *BJOG*, 2008, 115(2): 1503-1511.
- [26] Tan PC, Daud SA, Omar SZ. Concurrent dinoprostion and oxytocin for labor induction in term premature rupture of membranes: a randomized controlled trial[J]. *Obstet Gynecol*, 2009, 113(5):1059-1065.
- [27] 邹丽颖, 范玲, 段涛, 等. 0.8mm 控释地诺前列酮栓用于足月胎膜早破促宫颈成熟的多中心研究 [J]. *中华妇产科杂志*, 2010,45(7):492-496.
- [28] Buchanan SL, Crowther CA, Levett KM, et al. Planned early birth versus expectant management for women with preterm prelabour rupture of membranes prior to 37 weeks' gestation for improving pregnancy outcome[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2010, (3): CD004735.
- [29] 漆洪波, 吴味辛. 重视未足月胎膜早破的研究 [J]. *中华妇产科杂志*, 2006,41(1): 3-6.
- [30] 漆洪波. 未足月胎膜早破的诊断和治疗策略 [J]. *中华妇幼临床医学杂志*, 2010, 6(4): 305-307.
- [31] Roberts D, Dalziel SR. Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation for women at risk of preterm birth[J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2006, (3): CD004454.
- [32] ACOG Committee on Obstetric Practice. ACOG Committee Opinion No. 475: antenatal corticosteroid therapy for fetal maturation[J]. *Obstet Gynecol*, 2011,117(2 Pt 1):422-424.
- [33] Onland W, de Laat MW, Mol BW, et al. Effects of antenatal corticosteroids given prior to 26 weeks' gestation: a systematic review of randomized controlled trials[J]. *Am J Perinatol*, 2011, 28(1): 33-44.
- [34] 中华医学会妇产科学会产科学组. 早产临床诊断与治疗指南 [J]. *中华妇产科杂志*, 2014, 49(7):481-485.
- [35] Gomez R, Romero R, Nien JK, et al. Antibiotic administration to patients with preterm premature rupture of membranes dose not eradicate intra-amniotic infection[J]. *J Matern Fetal Neonatal Med*, 2007, 20(2): 167-173.
- [36] DiGiulio DB, Romero R, Kusanovic JP, et al. Prevalence and diversity of microbes in the amniotic fluid, the fetal inflammatory response, and pregnancy outcome in women with preterm pre-labor rupture of membranes[J]. *Am J Reprod Immunol*, 2010,64(1):38-57.
- [37] Mercer BM, Miodovnik M, Thurnau GR, et al. Antibiotic therapy for reduction of infant morbidity after preterm premature rupture of the membranes. A randomized controlled trial. National Institute of Child Health and Human Development Maternal-Fetal Medicine Units Network[J]. *JAMA*, 1997,278(12):989-995.
- [38] Kenyon SL, Taylor DJ, Tarnow-Mordi W. Broad-spectrum antibiotics for preterm, prelabour rupture of fetal membranes: the ORACLE I randomised trial. ORACLE Collaborative Group[J]. *Lancet*, 2001, 357(9261): 979-988.
- [39] Kenyon S, Boulvain M, Neilson J. Antibiotics for preterm rupture of membranes: a systematic review[J]. *Obstet Gynecol*, 2004,104(5 Pt 1):1051-1057.
- [40] Combs CA, Mc Cune M, Clark R, et al. Aggressivetocolysis

does not prolong pregnancy or reduce neonatal morbidity after preterm premature rupture of the membranes[J]. Am J Obstet Gynecol, 2004,190(6):1723-1728.

[41] Mackeen AD, Seibel-Seamon J, Grimes-Dennis J, et al. Tocolytics for preterm premature rupture of membranes[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2011, (10): CD007062.

[42] Giraldo-Isaza MA, Berghella V. Cervical cerclage and preterm

PROM[J]. Clin Obstet Gynecol, 2011,54(2): 313-320.

[43] Laskin MD, Yinon Y, Whittle WL. Preterm premature rupture of membranes in the presence of cerclage: is the risk for intra-uterine infection and adverse neonatal outcome increased?[J]. J Matern Fetal Neonatal Med, 2012,25(4):424-428.

(收稿日期: 2014-09-28)

(本文编辑: 侯存明)

• 消息 •

第七届围产医学新进展高峰论坛会议通知 (第二轮)

尊敬的医师:

您好!

“第七届围产医学新进展高峰论坛”将于 2015 年 4 月 23~26 日在河南省郑州市召开。本次会议由中华医学会围产医学分会主任委员、《中华围产医学杂志》总编辑、北京大学第一医院妇产科杨慧霞教授担任,大会执行主席由《中华围产医学杂志》编委、中华医学会围产医学分会委员、河南省围产医学专业委员会主任委员崔世红教授担任。

会议将围绕指南与共识的解读、胎儿医学、围产期营养、新生儿代谢病等围产医学领域的研究进展进行讨论,授予国家级 I 类医学继续教育学分。欢迎踊跃参会!

一、会务安排

1. 会议地点: 河南省郑州市嵩山饭店 (郑州市中原区伊河路 156 号, 酒店电话: 0371-67176699)。

2. 会议报到: 2015 年 4 月 23 日 (周四) 下午 1:00 开始。

3. 会议时间: 2014 年 4 月 24-4 月 26 日。

4. 酒店住宿及要求:

嵩山饭店: 普通标间: 300 元/间; 商务标间 330 元/间; 豪华标间 360 元/间 (以上房间均含双人早餐)。

★ 订房中心信息:

名称: 北京恒瑞会议服务有限公司

订房联系人: 刘博雅 15801588696; 010-52851959

订房邮箱: weichanhuiyi@163.com

订房传真: 010-65069068

★ 住宿须知:

1. 团队订房请直接联系订房中心, 其他参会代表请在大会网站注册后直接预订房间并支付房费。

2. 不通过大会订房不能享受优惠价格。

3. 预订时间: 2015 年 3 月 3 日-4 月 17 日止。

二、会议注册费及优惠

1. 报到时全额支付: 1000 元/人 (含会议资料费和会议期间餐费), 住宿费自理。

2. 优惠政策: 满足以下条件者, 可享受会务注册费优惠 (每位正式注册代表限本人享受其中一项优惠措施):

★ 凡提前在 <http://www.cjpm.org.cn> 中华围产医学杂志官网上注册、报名并支付会务注册费者, 优惠 20%, 即 800 元。

★ 在读研究生凭本人有效学生证和身份证, 优惠 40%, 即 600 元/人。

★ 西部地区 (青海、新疆、宁夏、甘肃、贵州、西藏) 的参会代表凭本人有效身份证和工作证, 会务注册费优惠 40%, 即 600 元/人 (含会议期间餐费和会议资料费), 住宿费自理。

★ 除郑州市以外的河南省参会代表: 凭本人有效身份证和工作证, 会务注册费优惠 40%, 即 600 元/人 (含会议期间餐费和会议资料费), 住宿费自理。

★ 河南省郑州市的参会代表: 凭本人有效身份证和工作证, 免除会务注册费。如需在会议就餐, 现场缴纳餐费 500 元/人。

注意:

★ 以上各种优惠方案, 优惠截止日期均为 2014 年 4 月 15 日, 以网上支付日期为准。截止日期之后所有现场报名及注册的参会者, 均需缴纳全额会务注册费 (1000 元/人)

★ 享受上述第 2~4 条优惠方案的参会代表, 现场报到时需提供本人有效身份证和工作证 (或学生证), 一经发现与优惠方案条件不符, 则取消相应优惠, 按现场报名注册处理, 补齐全额注册费。

三、会议报名方式

本次会议仅接受通过会议官方网站的报名注册。会议官方网站 <http://www.cjpm.org.cn>, 会议报名、注册、会务注册费用及住房订金缴纳全部在该网站进行。

四、学分

凡通过本次会议官方网站注册报名并报到参会的代表, 会后可授予国家级 I 类医学继续教育学分。

会议最新消息敬请关注本刊微信“中华围产医学杂志”的通知!

《中华围产医学杂志》编辑部

2015 年 3 月