- 妇产科常见急腹症
  - 与妊娠相关
    - 胎盘早剥
      - 症状
        - 轻型胎盘早剥：阴道出血少，或无明显征象
        - 重型胎盘早剥：阴道出血较多或腹痛明显，子宫强直收缩
      - 体征 — 轻度腹痛或持续腹痛、恶心、呕吐等休克征象，呈板状腹
      - 高危因素：血管病变、机械性因素、子宫张力突然升高、吸烟、胎膜早破
      - 辅助检查：B超

支持点：患者持续腹痛,程度剧烈
不支持点：无相关高危因素,无阴道流血,胎心正常,B超无胎盘早剥

    - 子宫破裂或先兆子宫破裂
      - 症状：宫缩剧烈、子宫下段压痛、下腹疼痛拒按、烦躁不安、胎儿窘迫等
      - 体征：病理性缩腹环、胎心改变或听不清
      - 高危因素：头盆不称、分娩梗阻、剖宫产史
      - 辅助检查：B超

支持点：疤痕子宫史，腹痛剧烈。
不支持点：胎心音正常，疤痕处无压痛

    - 卵巢囊肿蒂扭转
      - 症状：突然发生一侧下腹剧痛，常伴恶心、呕吐甚至休克
      - 体征：可有发热及腹肌紧张，附件可扪及肿物，有压痛
      - 高危因素：药物、怀孕、家族史、子宫内膜异位症、卵巢囊肿病史
      - 辅助检查：B超

支持点：剧烈腹痛,B超提示子宫右侧囊肿包块。
不支持点：多为一侧突发腹痛

    - 子宫肌瘤 — 病史不支持
    - 异位妊娠 — 病史不支持
    - 子宫扭转 — 病史不支持
  - 外科急腹症
    - 妊娠相关急性阑尾炎 — 支持点：突发的中上腹或挤周疼痛、呕吐
    - 脾破裂 — 不支持点：体温正常、白细胞不高、B超提示阑尾显示不清、无转移性右下腹痛、麦氏点无压痛反跳痛
    - 胆囊炎 — B超无异常
    - 肠梗阻 — 大便正常，无其他症状及体征
    - 胆结石 — B超无异常
    - 急性胰腺炎 — 实验室结果正常，清淡饮食
  - 内科急腹症
    - 急性胃肠炎
      - 支持点：腹痛、呕吐
      - 不支持点：无肠胃用药，无胃炎病史，大便正常
    - 肾盂肾炎 — B超无异常，实验室检查正常

Presented with XMind