妇产科常见急腹症

- 与妊娠相关
  - 胎盘早剥
    - 症状
      - 轻型胎盘早剥：阴道出血少，或无明显征象
      - 重型胎盘早剥：阴道出血较多或腹痛明显，子宫强直收缩
    - 体征 — 轻度腹痛或持续腹痛、恶心、呕吐等休克征象，呈板状腹
    - 高危因素：血管病变、机械性因素、子宫张力突然升高、吸烟、胎膜早破
    - 辅助检查：B超
  - 子宫破裂或先兆子宫破裂
    - 症状：宫缩剧烈、子宫下段压痛、下腹疼痛拒按、烦躁不安、血尿、胎儿窘迫等
    - 体征：病理性缩腹环、胎心改变或听不清
    - 高危因素：头盆不称、分娩梗阻、剖宫产史
    - 辅助检查：B超
  - 卵巢囊肿蒂扭转
    - 支持点：MRI提示右侧附件区恶性病灶
    - 不支持点：多为一侧突发腹痛
  - 子痫前期 — 病史不支持
  - 子宫肌瘤 — 病史不支持
  - 异位妊娠 — 病史不支持
  - 子宫扭转 — 病史不支持
- 外科急腹症
  - 妊娠合并急性阑尾炎
    - 支持点：突发的中上腹或挤周疼痛、白细胞升高
    - 不支持点：B超阑尾不显示，无转移性右下腹痛，麦氏点无压痛反跳痛
  - 脾破裂 — 病史不支持点
  - 胆囊炎 — B超无异常
  - 肠梗阻 — 大便正常，无其他症状及体征
  - 胆结石 — B超无异常
  - 急性胰腺炎 — 实验室检查正常
- 内科急腹症
  - 急性胃肠炎
    - 支持点：腹痛明显
    - 不支持点：无消化道症状
  - 肾盂肾炎 — B超无异常，实验室检查正常

支持点：患者持续腹痛,程度剧烈
不支持点：无相关高危因素,无阴道流血,胎心正常,B超无胎盘早剥

支持点：三次疤痕子宫史，胎盘植入，B超少量腹腔积液。不支持点：腹痛脐周明显，程度剧烈，胎心音正常，疤痕处无疼痛

Presented with XMind