

第十章

【本章小结】

第十章分娩期并发症妇女的护理



分娩期并发症

产后出血

概述

经阴道分娩者24h出血量 $\geq 500\text{ml}$, 剖宫产者 $\geq 1000\text{ml}$, 是我国产妇死亡原因的首位

病因

- 子宫收缩乏力
- 胎盘因素
- 软产道裂伤
- 凝血功能障碍

临床表现

- 宫缩乏力: 间歇性阴道流血
- 胎盘因素: 胎儿娩出数分钟内发生阴道流血, 色暗红
- 软产道裂伤: 胎儿娩出后即发生阴道出血, 色鲜红
- 凝血功能障碍: 血液不凝

处理原则

针对出血原因, 迅速止血, 补充血容量, 防治失血性休克, 预防感染

羊水栓塞

病因

- 栓子进入肺小血管导致肺栓塞
- 胎毛、胎脂、胎粪吸入

临床表现

- 前驱期: 表现为憋气、呛咳、气急、心慌、胸痛、头晕、烦躁不安、恶心、呕吐等非特异性症状
- 休克期: 产妇突感寒战, 出现呛咳, 继而出血呼吸困难, 血压急剧下降, 病情凶险者仅尖叫一声即进入休克状态或死亡
- 出血期: 大量阴道出血、针眼渗血, 出血不凝
- 肾衰期: 急性肾衰竭——全身循环衰竭

辅助检查

血涂片查找羊水有形物质

治疗

改善低氧血症、抗过敏、抗休克, 纠正呼吸循环功能衰竭, 防止DIC和肾功能衰竭