

[第五章习题参考答案及解析]

一、单项选择题

1. 【答案】A。肠套叠常表现为频繁呕吐、拒食、烦躁不安等，伴有暗红色果酱样大便。
2. 【答案】C。婴幼儿对突然出现的较大声响反应淡漠，提示听力异常。
3. 【答案】A。正常婴幼儿的腋下温度为 $36^{\circ}\text{C} \sim 37.4^{\circ}\text{C}$ ，较成人略高，且易波动。
4. 【答案】D。婴幼儿便秘常见于宝宝食量小、食物太精细、运动少或见于消化不良、先天性巨结肠等疾病。大多因为饮食原因导致肠道功能紊乱。
5. 【答案】B。正常情况下，婴儿每日尿量 $400 \sim 500 \text{ mL}$ ，幼儿 $500 \sim 600 \text{ mL}$ ，尿液呈淡黄色，澄清透明。
6. 【答案】A。当某种因素刺激虫体时，可使蛔虫上下蠕动，刺激肠道引起痉挛疼痛。按揉和热敷会加重病情，刺激虫体穿破肠壁，引起弥漫性腹膜炎。
7. 【答案】D。婴幼儿出现下列情况应立即去看医生：如果宝宝突然哭吵，尖声叫唤，或一阵一阵地哭，尽管母亲抚摸、怀抱仍啼哭不止。反复、频繁的呕吐，伴有精神萎靡、吃奶量减少、前囟门饱满，呕吐物中带有血或黄绿色液体、或有大量的奶块。大便次数比平时明显增多，大便变成水样、蛋花样或带有血或黏液，伴有口干、眼眶凹陷、尿少、精神差等脱水表现。体温在 39°C 以上或 35°C 以下等。
8. 【答案】C。宝宝的房间应每天定时开窗通风，保持空气新鲜，经常去户外享受阳光和新鲜的空气，尽量不带宝宝去人多的公共场所。
9. 【答案】B。不要随意离开输液区域。输液的区域一般是经过消毒的，护士也会在输液过程中随时观察孩子的反应。离开输液区域后，一切安全都没有保障，若出现严重反应，后果将不堪设想。
10. 【答案】A。婴儿期的宝宝不用氯霉素，该药可引起灰婴综合征等。
11. 【答案】C。婴幼儿如果出现面色苍白、泛黄，口唇以及睑结膜等处明显苍白、青紫，或皮肤出现黄染，应立即就诊。

12.【答案】B。蛋花汤稀水样大便多见于消化不良、频繁更换配方乳品种致肠道功能紊乱、肠炎、轮状病毒感染等疾病。

13.【答案】A。虽然尿液的颜色可以提示一些疾病，但是尿液颜色与饮食、服药也有关系。最常见的是大量进食胡萝卜后，尿液呈黄色。

14.【答案】C。宝宝肠痉挛发作时主要表现为持续、难以安抚的哭闹，严重发作时将影响宝宝睡眠质量。究其原因可能与宝宝肠道气体过多、肠道动力增高，胃肠道局部受凉、喂食凉奶或肠道对食物(牛奶)过敏等有关，也有学者推测与婴儿植物神经功能紊乱有关。

15.【答案】A。体重小于 2000 g 的宝宝在寒冷季节不宜洗澡，可适当擦澡，室内保持适宜的温湿度。

二、是非题

1.【答案】√。添加辅食后，给宝宝服用过铁剂(如葡萄糖酸亚铁)或大量含铁的食物(如动物肝脏)可引起假性黑便血。

2.【答案】×。若清晨起床时发现儿童眼睑浮肿、尿液色红、尿量明显减少，常是急性肾炎的征兆。若排尿次数明显增加，患儿自我感觉尿痛、尿急，常是尿路感染的表现。

3.【答案】×。非紧急情况，应在网上预约挂号，关注就诊医院的微信公众号，如果不知道去哪一科就诊，大多数医院有专门的咨询电话，可以先电话咨询，再理性地安排好就诊时间。紧急情况需看急诊时，不需要预约。

4.【答案】√。用药前必须仔细看清生产日期、有效期及药物有无变质。不得使用过期药品。

5.【答案】×。宝宝的用药不是成人用药的减量而已，由于宝宝各器官系统的发育尚未成熟，特别是参与药物代谢的肝脏和肾脏功能不完善，必须使用儿童专用药物，剂量和用法严格按药物说明书或遵医嘱应用。

6.【答案】√。先天性胆道梗阻或闭锁的宝宝从出生起大便颜色就是灰白色或陶土色，小便呈深黄色，皮肤颜色暗黄。

7.【答案】×。宝宝尿量与气温、活动量、饮食种类及精神因素有关。如饮水多，则排尿多；气温高、剧烈活动后出汗多时，则尿量减少。

8.【答案】√。正常婴幼儿多汗见于运动、高温环境、情绪激动等，这种出汗多为对称性，且以头颈部、手掌、足底等处明显。因为疾病因素而导致的多汗，与室温、季节、衣服厚薄等无关，常见于佝偻病、低血糖等。

9.【答案】√。宝宝出生后 2 周黄疸仍未退，黄疸很深伴精神差，吃奶差，应及时就诊。

10.【答案】×。得了肺炎的宝宝常常会咳嗽、喘息、呼吸频率加快、张口呼吸等，其经口、鼻腔丢失的水分大大增加，痰液变得黏稠，不易咳出，甚至可能阻塞呼吸道，所以宝宝咳嗽时应少量多次喂温开水，可稀释痰液，并辅以拍背排痰，以保持呼吸道通畅，促进疾病康复。