

第十三章课后练习

1. 关于产褥感染的防治, 下述哪项不妥:() 2009

- A. 加强孕期保健
- B. 产时尽量少作肛查
- C. 产前、产时常规用抗生素
- D. 产褥期保持外阴清洁
- E. 掌握阴道检查适应证

答案: C

【解析】加强孕期卫生宣传, 临产前 2 个月避免性生活及盆浴, 加强营养, 增强体质。及时治疗外阴阴道炎及宫颈炎等慢性疾病和并发症, 避免胎膜早破、滞产、产道损伤与产后出血。消毒产妇用物, 接产时按照无菌操作, 正确掌握手术指征, 保持外阴清洁。必要时给予广谱抗生素预防感染。故选 C。

2. 某产妇, 产后 6d 发热 40℃, 恶露多而混浊, 有臭味, 子宫复旧不佳, 有压痛。下述哪项护理不妥:() 2009

- A. 半卧位
- B. 床边隔离
- C. 物理降温
- D. 抗感染治疗
- E. 坐浴, 1~2 次/天

答案: E

【解析】此产妇有产褥期感染, 产妇应取半卧位, 有利于恶露引流和使炎症局限于盆腔内, 选项 A 正确。进行床边隔离可防止交叉感染的发生, 选项 B 正确。此产妇有发热, 可进行物理降温, 选项 C 正确。此时有感染、子宫压痛, 应适当地应用抗生素, 进行抗感染治疗, 选项 D 正确。故选 E。

3. 患者, 女, 25 岁。产后 1 周出现会阴侧切伤口感染, 细菌培养结果为金黄色葡萄球菌感染。该细菌最有可能存在耐药性的抗生素是() 2016

- A. 头孢菌素
- B. 红霉素
- C. 甲硝唑
- D. 青霉素
- E. 两性霉素

答案：D

【解析】近年来，金黄色葡萄球菌对青霉素的耐药率已经高达90%左右。

4. 患者，女，28岁。孕27周，因胎儿畸形行引产术后2周，感自责、自罪，并有自伤行为。该患者最可能发生的心理障碍是()2017

- A. 产后自残
- B. 产后抑郁
- C. 产后沮丧
- D. 产后焦虑
- E. 产后紧张

答案：B

【解析】该患者因胎儿畸形行引产术后，有自责、自罪的心理和自我伤害的行为，考虑为产后抑郁。

5. 关于产褥感染护理措施的叙述，错误的是()2018

- A. 保证足够液体摄入
- B. 每4小时测体温1次
- C. 给予高蛋白质饮食
- D. 产妇取平卧臀部抬高位
- E. 遵医嘱使用广谱抗生素

答案：D

【解析】产褥感染的护理措施：①控制感染。严密观察患者的生命体征，意识状态及全身情况，注意恶露的量、颜色、气味、伤口愈合情况等，发现异常及时报告医生并协助治疗；体温超过39℃者给予物理降温，鼓励产妇多饮水，摄入高热量，高蛋白质，

高维生素，易消化的饮食，必要时遵医嘱静脉补充液体，注意加强口腔，皮肤的清洁护理；做好细菌培养及药物敏感试验，遵医嘱应用敏感，足量，高效抗生素，有效控制感染。②减轻疼痛。向产妇解释疼痛的原因，协助其取半卧位或抬高床头，利于恶露引流及炎症局限；会阴侧切者应取健侧卧位，并保持切口干燥、清洁；用 0.1% 苯扎溴铵溶液擦洗或冲洗会阴每天 2 次；会阴水肿者，局部可用 50% 硫酸镁湿热敷；嘱下肢血栓性静脉炎者，抬高患肢，局部保暖并给予热敷，以促进血液循环减轻肿胀。③减轻焦虑。鼓励产妇说出焦虑的原因及心理感受，消除其顾虑，树立信心，配合治疗过程。

6. 患者，女，27 岁。足月自然产后 4 天，出现下腹痛，体温正常，恶露多，有臭味，子宫底脐上 1 指，子宫体软。应考虑为 () 2019

- A. 子宫肌炎
- B. 盆腔结缔组织炎
- C. 子宫内膜炎
- D. 急性输卵管炎
- E. 腹膜炎

答案：C

【解析】产褥感染主要表现为发热、疼痛和异常恶露。其中，子宫内膜炎表现为子宫内膜充血、坏死，阴道内有大量脓性分泌物，而且有臭味。

7. 产妇，27 岁。足月产后 3 天，出现下腹痛，体温不高，恶露多，有臭味，子宫底位于脐上 1 指，子宫体软。下列护理措施中，错误的是 () 2016

- A. 做好会阴护理
- B. 半卧位或抬高床头
- C. 监测体温变化
- D. 做好心理支持
- E. 红外线照射会阴部每日 3 次，每次 1 小时

答案：E

【解析】红外线照射属于热疗法，每次时间不应超过 30 分钟，以防产生继发效应。

(8-9 题共用题干) 2017

某产妇产后 3 天，体温 38℃，自觉腹痛，宫底脐上 1 指，宫体软，恶露多，味臭。

8. 首先考虑的诊断为()

- A. 子宫内膜炎、子宫肌炎
- B. 急性盆腔结缔组织炎
- C. 急性输卵管炎
- D. 弥散性腹膜炎
- E. 血栓性静脉炎

答案：A

【解析】该产妇产后恶露多、味臭，考虑发生了产褥感染，表现为急性子宫内膜炎、子宫肌炎，两者常伴发。

9. 该产妇应采取的体位是()

- A. 去枕平卧位
- B. 半卧位
- C. 左侧卧位
- D. 右侧卧位
- E. 膝胸卧位

答案：B

【解析】产妇宜采取半卧位，有利于恶露引流，炎症局限，防止感染扩散。

(王自盼)