

第十四章课后练习

1. 关于剖宫产术后护理, 下述哪项正确:()2009

- A. 术后取半卧位, 有利于恶露排出
- B. 留置导尿管 12 h
- C. 术后体温超过 38℃ 不必处理
- D. 产后 1 周开始喂奶
- E. 产后 2 h 内密切观察阴道流血, 子宫收缩

答案: A

【解析】剖宫产的产妇恶露不易排出, 通常取半卧位, 同时配合多翻身, 就会促使恶露排出, 故选项 A 正确。剖宫产术前给产妇放置导尿管, 一般在术后 24~48 h、待膀胱肌肉恢复收缩排尿功能后拔掉, 故选项 B 错。剖宫产术后有吸收热, 但体温一般不超过 38℃, 体温超过 38℃ 需要查明原因, 选项 C 错。剖宫产术后 2~3d 可以喂奶, 选项 D 错。剖宫产术后 12 h 内密切观察阴道流血、子宫收缩, 选项 E 错, 故选 A。

2. 剖宫产术前准备哪项是错误的:()2010

- A. 禁食、水
- B. 留置导尿管
- C. 准备腹部皮肤
- D. 鉴定血型、备皮
- E. 常规应用吗啡

答案: E

【解析】①做普鲁卡因、麦角新碱及缩宫素等过敏试验, 并做好输液、输血(必要时)及婴儿窒息急救等准备。危重病者, 应先进行必要的救治。其他同一般腹部手术, 但禁用吗啡, 以免引起胎儿窒息。②消毒腹壁前先导尿, 并留置导尿管。③临手术前再听 1 次胎心音, 必要时再做 1 次肛指检查。如发现分娩有进展, 胎儿有从阴道娩出可能者, 应暂停手术准备, 作进一步观察。故选 E。

3. 初产妇, 第 1 胎, 妊娠 38 周住院待产期间, 突然发现胎心率 180 次/分, 经处理无好转, 拟紧急剖宫产术, 术前准备正确的是:()2011

- A. 情况紧急不必备皮
- B. 能排尿者不必插尿管
- C. 常规注射吗啡
- D. 常规复查胎心音
- E. 术前立即灌肠 1 次

答案: D

【解析】常规备皮, 插尿管, 因胎儿宫内窘迫不能灌肠和给予镇静药。

(李匀娥)