

第四章课后练习

1. 下述哪种先露最多见：() 2010

- A. 枕先露
- B. 肩先露
- C. 臀先露
- D. 面先露
- E. 足先露

答案：A

【解析】最先进入骨盆入口的胎儿部分称为胎先露。纵产式有头先露和臀先露，横产式为肩先露。头先露根据胎儿屈伸程度分为枕先露、前凶先露、额先露及面先露。臀先露分为混合臀先露、单臀先露、单足先露、双足先露。横产式时最先进入骨盆的是胎儿肩部，为肩先露。偶见胎儿头先露或臀先露与胎手或胎足同时入盆，称复合先露。临床上枕先露占 95.55%~97.55%，以枕左前位最多见。故选 A。

2. 中期妊娠是指孕：() 2010

- A. 11~25 周
- B. 12~28 周
- C. 13~28 周
- D. 18~28 周
- E. 20~28 周

答案：C

【解析】妊娠是胚胎和胎儿在母体内发育成长的过程。成熟卵受精是妊娠的开始，胎儿及其附属物娩出是妊娠的终止。妊娠期通常从末次月经第 1 天算起。临床上将妊娠全过程(平均 40 周)分为 3 个时期：①妊娠 12 周末以前称早期妊娠；②第 13~27 周末称中期妊娠；③第 28 周及以后称晚期妊娠。故选 C。

3. 某女士，妊娠 8 周，不应该：() 2010

- A. 有早孕反应

- B. 出现尿频现象
- C. 乳房增大，乳晕着色
- D. 在耻骨联合上扪及子宫底
- E. 尿妊娠试验呈阳性

答案：D

【解析】停经妇女在停经 6 周前后出现头晕、疲乏、嗜睡、食欲不振、偏食、厌恶油腻、恶心、晨起呕吐等，称为早孕反应。妊娠早期膀胱受增大子宫体压迫，膀胱容量减少，故排尿次数增多。妊娠期受垂体催乳激素、胎盘生乳素、雌激素、孕激素等激素刺激，乳腺管和腺泡增生，脂肪沉积，使乳房增大，乳晕变黑。妊娠 12 周后才能在耻骨联合上扪及子宫底。故选 D。

4. B 超显像检查，可见到妊娠环的时间是在妊娠的：()

2011

- A. 第 2 周
- B. 第 3 周
- C. 第 4 周
- D. 第 5 周
- E. 第 6 周

答案：D

【解析】早期妊娠诊断主要是靠病史与症状、体征和辅助检查。辅助检查中的 B 超是检查早孕和确定胎龄中最快速、准确的方法，最早可在孕 5 周时作出早期诊断。

5. 妊娠 6 个月以前胎心音听诊最清楚的部位是：()

2011

- A. 右下腹
- B. 左上腹
- C. 脐下正中线处
- D. 右上腹
- E. 左下腹

答案：C

【解析】听到胎心音可确定妊娠且为活胎，于妊娠 12 周后可用多普勒胎心音听诊器听到胎儿心音，妊娠 18~20 周可用一般听诊器听到。妊娠 24 周前胎儿心音多在脐下正中或稍偏左、右听到。于妊娠 24 周后，胎儿心音多在胎背侧听得最清楚。

6. 左枕前位表示胎儿的枕骨在母体骨盆的：()2018

- A. 左前方
- B. 右前方
- C. 中部
- D. 右后方
- E. 左后方

答案：A

【解析】胎位是指胎儿先露部指示点与母体骨盆的关系，正常胎位多为枕前位。胎儿在临分娩时由腹腔进入骨盆通道，应该最先进入的是头部，头部俯曲到位的为枕先露，即最先通过的是胎儿的枕骨，胎儿枕骨是相对于母体而言，位于母体骨盆的左前方，就为左枕前位。

7. 正常胎方位是指：()2019

- A. 臀位
- B. 横位
- C. 枕前位
- D. 持续性枕横位
- E. 持续性枕后位

答案：C

【解析】分娩时除了枕前位为正常胎位外，其余均为胎位异常。

(段虹)