

第六章课后练习

1. 下列哪种情况需应用压力疗法()
 - A. 久坐或久站者
 - B. 10~21 天愈合的烧伤
 - C. 21 天以上愈合的烧伤
 - D. 已削痂植皮的深Ⅱ度、Ⅲ度烧伤
 - E. 以上都是
2. 压力治疗理想的压力为()
 - A. 24~25 mmHg
 - B. 34~35 mmHg
 - C. 44~45 mmHg
 - D. 14~15 mmHg
 - E. 4~5 mmHg
3. 压力治疗至少需要持续多久()
 - A. 1~3 个月
 - B. 3~6 个月
 - C. 6~12 个月
 - D. 12~18 个月
 - E. 18~24 个月
4. 正确穿戴压力衣的方法是()
 - A. 每天 2 小时
 - B. 每天 6 小时
 - C. 每天 12 小时
 - D. 除洗澡外应 24 小时穿戴
 - E. 以上说法都不对
5. 下列对弹力绸带加压法说法错误的是()
 - A. 对肢体包扎时, 由远端向近端缠绕
 - B. 每圈间相互重叠 $1/3 \sim 1/2$; 末端避免环状缠绕
 - C. 压力以绸带下刚好能放入两指较为合适

D. 弹力细带加压法每 4~6 小时更换一次

E. 以上都是

6. 以下必须进行预防性加压的是()

A. 10 天内愈合的烧伤创面

B. 10~21 天愈合的烧伤创面

C. 21 天以上愈合的烧伤创面

D. 5~10 天愈合的烧伤创面

E. 2 度烧伤创面

7. 压力治疗每天应持续的时间为()

A. 大于 2 小时

B. 大于 4 小时

C. 大于 8 小时

D. 大于 12 小时

E. 大于 23 小时

8. 制作压力衣时, 压力衣至少应超出瘢痕范围()

A. 1 cm

B. 2 cm

C. 3 cm

D. 4 cm

E. 5 cm

9. 压力治治疗的有效压力范围是()

A. 10~40 mmHg

B. 10~24 mmHg

C. 24~25 mmHg

D. 25~40 mmHg

E. 大于 40 mmHg