

## 第五章课后练习

1. 李某存在听力障碍，应做何种处理( )
  - A. 使用神经营养药物
  - B. 使用血管扩张药物
  - C. 使用抗生素类药物
  - D. 配戴助听器
  - E. 使用中药
2. 耳蜗底部受损时，出现的听力障碍主要是( )
  - A. 低频听力
  - B. 高频听力
  - C. 高、中频听力
  - D. 中、低频听力
  - E. 中频听力
3. 关于耳聋的分类，错误的是( )
  - A. 按病变性质可分为器质性聋和功能性聋
  - B. 按病变部位可分为传导性聋 H、感音神经性听力损失和混合性耳聋
  - C. 按耳聋程度一般可分为 5 级：轻度耳聋、中度耳聋、中重度耳聋、重度耳聋和极重度聋
  - D. 根据耳聋发生的年龄，可分为成年前聋和成年后聋
  - E. 按耳聋出现时间可分为先天性聋和后天性聋
4. 对于听力障碍儿童语言特征的描述，正确的是( )
  - A. 音量正常
  - B. 音量异常，音色正常
  - C. 音量异常，音调正常
  - D. 语言发育基本正常
  - E. 上述各种情况都可能出现异常
5. 中度听力障碍是指听力损失在( )
  - A. 26~40 dB

B. 41~55 dB

C. 11~20 dB

D. 71~90 dB

E. 91 dB

6. 悄悄行驶的小汽车发出( )分贝的声音。

A. 20~30

B. 30~40

C. 40~50

D. 50~60

E. 80~90

7. 聋儿训练的原则中没有哪项( )

A. 尽早查明听力

B. 尽早配助听器

C. 尽早进行科学的听力言语训练

D. 尽早手术

E. 使用药物

8. 由内耳, 听觉神经或听觉中枢病变所致的听力障碍, 称为( )

A. 传导性耳聋

B. 感音神经性耳聋

C. 混合型耳聋

D. 先天性耳聋

E. 遗传性耳聋

9. 慢性化脓性中耳炎最突出的症状是( )

A. 长期耳流脓

B. 耳鸣、耳聋

C. 耳流血伴疼痛

D. 耳痛

E. 耳闷、堵塞感

10. 男性, 40 岁, 原双耳听力好, 昨右耳被鞭炮震后耳痛, 听

力稍减退，耳鸣及耳道少量出血。最可能是下列哪一种疾病？  
( )

- A. 外耳道损伤
- B. 鼓膜外伤
- C. 爆聋
- D. 颞骨骨折
- E. 听骨链断裂