

第六章课后练习

1. 下列器官中不属于调音器官的是()

- A. 硬腭
- B. 鼻腔
- C. 喉
- D. 唇
- E. 软腭

2. 下列哪项不是针对软腭抬高的方法()

- A. 用力叹气
- B. 用压舌板辅助抬高软腭
- C. 舌运动训练
- D. 用软毛刷刺激软腭
- E. 用冰块刺激软腭

3. 有关咽喉的叙述错误的是()

A. 咽可分为鼻咽、口咽、喉咽，与食管相连，成人全长约 12 ~ 14 cm

B. 喉咽部有环咽肌环绕，前方为喉

C. 若有异物进入咽部，可因环咽肌收缩阻止下行，并诱发呕吐反射，吐出异物

D. 发音时咽腔可改变形状，产生共鸣，使声音清脆悦耳，其中声带的作用尤其重要

E. 喉相当于 4~6 颈椎的高度，女性较男性稍高，小儿喉较成人高

4. 洼田饮水实验要求患者按习惯喝下温水多少毫升()

- A. 15 mL
- B. 20 mL
- C. 30 mL
- D. 40 mL
- E. 60 mL

5. 咽鼓管鼓室口开口于鼓室()

- A. 外壁
- B. 内壁
- C. 前壁
- D. 后壁
- E. 下壁

6. 缩唇呼吸训练的目的是()

- A. 提高支气管内压, 避免塌陷
- B. 降低胸腔压力
- C. 提高膈肌肌力
- D. 增加肺活量
- E. 改善肺循环

7. 在摄食直接训练中, 不能坐位的患者至少取躯干()仰卧位。

- A. 20°
- B. $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$
- D. 50°
- E. 60°

8. 哪项检查被认为是吞咽障碍检查的“理想方法”和诊断的“金标准”()

- A. 电视荧光放射吞咽功能检查
- B. 电视内镜吞咽功能检查
- C. 超声检查
- D. 放射性核素扫描检查
- E. 表面肌电图

9. 侧方吞咽适用于什么情况的患者()

- A. 食团口内运送慢者
- B. 舌根部后推运动不足患者
- C. 咽期吞咽启动迟缓患者
- D. 侧舌肌和咽肌麻痹患者

E. 咽收缩无力患者

10. 在摄食-吞咽功能等级评定中, 根据下列相关的表现, 选出相对应的等级评定()

A. 重度

B. 中度

C. 轻度

D. 0 度

E. 正常

11. 咽的生理功能以下哪点是错的()

A. 呼吸功能

B. 吞咽功能

C. 共鸣功能

D. 嗅觉功能

E. 防御功能

12. 下列饮水试验的结果, 哪些属于存在吞咽障碍或怀疑有吞咽障碍的情况()

A. 可 5 秒内一次喝完 30 mL 水, 无呛咳

B. 分两次以上喝完 30 mL 水, 无呛咳

C. 能一次喝完 30 mL 水, 但有呛咳

D. 分两次以上喝完 30 mL 水, 有呛咳

E. 常常呛住, 难以全部喝完 30 mL 水