

第二章 围生期保健

A1 型选择题

1. 我国常用围生期定义: ()
 - A. 孕满 28 周至出生后 7 天之内(出生儿体重 $\geq 1\,000\text{g}$)
 - B. 孕满 20 周至出生后 28 天之内(出生儿体重 $\geq 500\text{g}$)
 - C. 孕满 28 周至出生后 28 天之内(出生儿体重 $\geq 1\,000\text{g}$)
 - D. 从胚胎形成至出生后 7 天之内
 - E. 孕满 20 周至出生后 14 天(出生儿体重 $\geq 1\,000\text{g}$)
2. 下列哪个时期小儿的死亡率最高: ()
 - A. 胎儿期
 - B. 围生期
 - C. 幼儿期
 - D. 学龄前期
 - E. 学龄期
3. 下列哪种情况需做产前诊断: ()
 - A. 初产妇年龄 33 岁
 - B. 配偶年龄 33 岁
 - C. 初产妇年龄 36 岁
 - D. 配偶年龄 36 岁
 - E. 初产妇年龄 30 岁, 双胎妊娠
4. 妊娠使用卡那霉素对胎儿或新生儿造成的不良后果是: ()
 - A. 牙色素沉着
 - B. 溶血性贫血
 - C. 第八对颅神经损害
 - D. 第六对颅神经损害
 - E. 动脉导管早闭

【参考答案】

1. A 2. B 3. C 4. C