

第五章 新生儿和婴幼儿常见疾病的预防保健

A1 型选择题

1. 新生儿窒息首选的复苏措施是：()
 - A. 吸氧
 - B. 清除呼吸道黏液
 - C. 肌注洛贝林
 - D. 复苏器加压给氧
 - E. 静脉滴注肾上腺素
2. 黄疸在生后 24 小时内出现者应首先考虑：()
 - A. 生理性黄疸
 - B. 新生儿溶血症
 - C. 新生儿肝炎
 - D. 新生儿败血症
 - E. 胆道闭锁
3. 关于新生儿黄疸预防保健的叙述，错误的是：()
 - A. 保管患儿衣物时勿放入樟脑丸
 - B. 指导家长观察黄疸进展情况
 - C. 母乳性黄疸的患儿需中断母乳喂养
 - D. 红细胞 G-6-PD 缺陷的患儿，忌食蚕豆
 - E. 有后遗症的患儿，给予康复治疗和功能锻炼
4. 新生儿寒冷损伤综合征最先发生硬肿的部位是：()
 - A. 上肢
 - B. 面颊部
 - C. 臀部
 - D. 躯干部
 - E. 小腿或大腿外侧
5. 早期发现营养不良患儿最主要的措施是：()
 - A. 开展生长发育监测
 - B. 开展健康教育
 - C. 指导喂养
 - D. 开展疾病预防
 - E. 开展体格锻炼
6. 维生素 D 缺乏性佝偻病预防措施不正确的是：()
 - A. 适当多晒太阳
 - B. 提倡母乳喂养
 - C. 孕母补充维生素 D 及钙剂
 - D. 1 个月时添加辅食

E. 早产儿 1 周开始补充维生素 D

7. 维生素 D 缺乏性佝偻病最可靠的早期诊断指标是：()

A. 日光照射不足及维生素 D 摄入不足的病史

B. 烦躁不安、夜惊、多汗等神经精神症状

C. 血钙、磷、碱性磷酸酶水平异常

D. 长骨 X 线检查异常及骨骼畸形

E. 血 $25-(OH)-VD_3$ 与 $1, 25-(OH)_2-VD_3$ 水平下降

8. 感染性腹泻最主要的病原：()

A. 病毒

B. 致病性大肠埃希菌

C. 空肠弯曲菌

D. 沙门氏菌

E. 真菌

9. 对婴幼儿腹泻的预防不应包括：()

A. 合理喂养

B. 注意饮食、饮水卫生

C. 加强环境卫生

D. 预防接种

E. 及时隔离患儿

10. 关于小儿肺炎的一般治疗，错误的措施是：()

A. 室内空气流通，保持一定温度、湿度

B. 保持呼吸道通畅，给氧

C. 经常变换体位，减少肺淤血

D. 供给易消化、富有营养的食物

E. 不能进食者给予静脉补液，液体量应 $100\sim 120\text{ mL}/(\text{kg}\cdot\text{d})$

11. 3 个月内的足月儿很少患营养性缺铁性贫血，主要原因是：()

A. 生长发育相对较慢

B. 红细胞破坏较少

C. 有充足的母乳喂养

D. 胎儿后期从母体内获得足够的储存铁

E. 铁排泄量少

12. 小儿营养性缺铁性贫血治疗的主要原则是：()

A. 加强护理，避免感染

- B. 合理饮食，注意休息
 - C. 去除病因，及时给予铁剂治疗
 - D. 控制慢性失血
 - E. 补充叶酸、维生素 B₁₂ 等微量营养素
13. 地方性甲状腺功能低下症的主要病因是：()
- A. 母亲孕期饮食中缺碘
 - B. 垂体分泌促甲状腺激素减少
 - C. 甲状腺发育异常
 - D. 甲状腺激素合成障碍
 - E. 母亲在妊娠期应用抗甲状腺药物
14. 新生儿先天性甲状腺功能低下症最早出现的症状常是：
()
- A. 便秘
 - B. 贫血、面色苍黄
 - C. 生理性黄疸时间延长
 - D. 呼吸、心跳慢
 - E. 纳差、吸吮缓慢
15. 苯丙酮尿症属于下列哪种类型的遗传代谢症：()
- A. X 性联不完全显性遗传病
 - B. 常染色体显性遗传病
 - C. X 性联完全显性遗传病
 - D. 常染色体隐性遗传病
 - E. 不伴性遗传病
16. 苯丙酮尿症的预防保健描述中错误的是：()
- A. 首选母乳喂养
 - B. 协助家长制订饮食方案
 - C. 监测血中苯丙氨酸浓度
 - D. 提供遗传咨询帮助
 - E. 坚持低苯丙氨酸饮食

【参考答案】

1. B 2. B 3. C 4. E 5. A 6. D 7. E 8. A 9. D
10. E 11. D 12. C 13. A 14. C 15. D 16. A