

## 第十三章 节育期妇女保健

### A1 型选择题

1. 放置宫内节育器后妊娠，应要取的处理方法是：( )
  - A. 无须处理，继续妊娠
  - B. 终止妊娠，保留节育器
  - C. 注意休息，保胎治疗
  - D. 取器后继续妊娠
  - E. 终止妊娠，同时取器
2. 剖宫产术后宫腔内放置节育器的时间应是：( )
  - A. 2 个月后
  - B. 3 个月后
  - C. 4 个月后
  - D. 5 个月后
  - E. 6 个月后
3. 放置宫内节育器最佳时间为月经干净后：( )
  - A. 1~5 天
  - B. 2~6 天
  - C. 3~7 天
  - D. 4~8 天
  - E. 5~9 天
4. 关于放置 IUD 术后随访时间错误的是：( )
  - A. 放置后 1 个月
  - B. 放置后 3 个月
  - C. 放置后 6 个月
  - D. 放置后 9 个月
  - E. 放置后 12 个月
5. 人工流产负压吸宫术适用于妊娠：( )
  - A. 10 周以内者
  - B. 12 周以内者
  - C. 14 周以内者
  - D. 16 周以内者

E. 18 周以内者

6. 有关人工流产下列不恰当的是：( )

- A. 负压应在 400~500mmHg
- B. 吸管进出宫颈时不应带有负压
- C. 术后可肌肉注射麦角新碱 0.2mg
- D. 先吸刮子宫四壁，最后吸刮宫底
- E. 注意手术中子宫位置的改变

7. 人工流产术后 2 周内或血未干净前应禁止盆浴，1 个月内应避免性生活，目的是：( )

- A. 预防子宫复旧不良
- B. 预防生殖器官感染
- C. 预防人工流产术后出血
- D. 预防尿路感染
- E. 预防宫缩痛

8. 假如药物流产失败，应采取的措施是：( )

- A. 加用缩宫素
- B. 加大米非司酮剂量
- C. 加大米索前列醇剂量
- D. 行负压吸宫术
- E. 继续观察

9. 下列哪种是口服短效避孕药：( )

- A. 炔诺孕酮
- B. 复方乙酸羟孕酮
- C. 庚炔诺酮
- D. 复方炔雌醚
- E. 复方炔诺酮

### 【参考答案】

1. E 2. E 3. C 4. D 5. A 6. C 7. B 8. D 9. E