

第十章 妊娠期妇女保健

A1 型选择题

1. 不属于妊娠早期保健应注意的事项是：()
 - A. 及早确诊妊娠
 - B. 及早进行第一次产前检查
 - C. 保护胚胎免受有毒有害因素影响
 - D. 警惕异位妊娠
 - E. 避免流产，绝对卧床休息
2. 在妊娠中期，不适合的保健措施是：()
 - A. 系统产前检查
 - B. 胎教
 - C. 先天异常的筛查
 - D. 检测胎儿的生长发育
 - E. 增加腹部力量训练，为生产做准备
3. 不属于妊娠晚期保健应注意的事项是：()
 - A. 指导孕妇自我监护胎动
 - B. 母乳喂养教育
 - C. 分娩准备教育
 - D. 高危妊娠的适时计划分娩
 - E. 增加腹部力量训练，为生产做准备
4. 孕产期产前检查开始的时间应为：()
 - A. 确诊早孕时
 - B. 孕 12 周
 - C. 孕 20 周
 - D. 孕 28 周
 - E. 孕期发现任何异常情况时
5. 孕期用药致胎儿畸形的主要影响因素为：()
 - A. 胎儿大小
 - B. 胎龄
 - C. 孕妇年龄
 - D. 孕妇高血压

E. 多胎

6. 孕产妇系统管理不正确的是：()

A. 从确诊早孕开始，建立孕产妇保健手册，纳入孕产妇系统管理

B. 产前检查农村不少于 4 次，城市不少于 6 次

C. 产后 7、14、28 天进行产后访视，42 天进行母子健康检查

D. 按规定产前检查

E. 及早筛查出高危妊娠

7. 不符合高危妊娠管理要求的是：()

A. 早建卡，早检查

B. 按规定产前检查，必要时增加次数

C. 专科门诊、专册登记、专人诊治、追踪矫治、住院分娩

D. 动员住院分娩，做好产后 42 天检查

E. 及早动员孕妇终止妊娠

8. 孕早期用药对胎儿的影响不包括以下哪项：()

A. 用药时的胎龄

B. 药物的性质及毒性强弱

C. 用药的剂量、途径

D. 用药的方法

E. 药物的价格

9. 为预防神经管畸形，每天应补充叶酸片：()

A. 0.1 毫克

B. 0.4 毫克

C. 1 毫克

D. 4 毫克

E. 5 毫克

【参考答案】

1. E 2. E 3. E 4. A 5. B 6. B 7. E 8. E 9. B