



护理专业融媒体教材系列

食管癌术后常见并发症 观察与护理

授课老师：易彩云



目录

Content



出血



吻合口瘘



乳糜胸




学习目标



- 1.了解食管癌术后常见有哪些并发症
- 2.掌握食管癌术后常见并发症的观察和护理要点

出血




→ 食管癌术后并发症的观察及护理

⊕ 胸腔引流液观察



活动性出血

正常胸引液



乳糜胸



出血



出血临床表现

持续2小时引流量超过100ml/h

鲜红色、有血凝块

血压下降

脉搏增快

躁动

少尿

出冷汗

低血容量





出血



出血护理要点

病情观察

补充血容量

引流液观察

止血、输血

手术准备



吻合口瘻





吻合口瘘

最严重并发症（颈部，胸部）术后5-10天，病死率高达50%

原因

- 食管的解剖特点，无浆膜覆盖，肌纤维呈纵行走向
- 食管血液供应呈节段性，易造成吻合口缺血
- 吻合口张力太大
- 感染、营养不良、贫血、低蛋白血症等。



吻合口瘘

临床表现

呼吸困难、胸腔积液、和全身中毒症状，如高热，寒战，甚至休克等

护理要点

立即禁食

闭式引流

抗感染、营养

观察、抗休克

手术配合



乳糜胸



乳糜胸

食管、贲门癌术后严重并发症

原因

多因伤及胸导管

多在术后2~10天，少数在2~3周

乳糜液呈乳白色、
不易凝固，放置
后分三层，上层
为黄色奶油状的
脂肪层





乳糜胸

临床表现

胸闷、气急、心悸、血压下降，可短期内全身消耗、衰竭而亡。

护理要点

密切观察

胸腔引流

肠外营养

小结



1. 食管癌术后常见的并发症有出血、吻合口瘘、乳糜胸
2. 胸腔引流液的观察非常重要，术后重点需要关注患者胸腔引流液的量、颜色的变化

THANKS

