



妇产科护理

第二十三章 妇产科诊疗及手术病人的护理



作者：粟芳

单位：湖南医药学院

目 录

Content



第一节

第二节

第三节

生殖道细胞学检查

宫颈活组织检查

常用穿刺检查

第四节

第五节

胎头吸引术

产钳术

目录

Content



第六节

剖宫产术

第七节

人工剥离胎盘术

第八节

诊断性刮宫术

第九节

妇产科内镜诊疗技术

第十节

输卵管通畅检查

第一节

生殖道细胞学检查



导入案例

王女士，46岁，经产妇，性生活后阴道点滴流血2个月，妇科检查：外阴阴道正常，宫颈上唇见柱状上皮异位样改变Ⅱ度，接触后有出血。

请思考：

1. 早期筛查宫颈癌应做什么检查？
2. 宫颈癌筛查需从多大年龄开始？几年复查一次？
3. 在月经周期的什么阶段宜做宫颈癌筛查？

第一节 生殖道细胞学检查

一、适应证与禁忌证

1. 适应证

- (1) 不明原因闭经。
- (2) 无排卵性异常子宫出血和黄体功能不足性异常子宫出血。
- (3) 流产。
- (4) 生殖道感染性疾病。
- (5) 妇科肿瘤的筛查。

第一节 生殖道细胞学检查

2. 禁忌证

- (1) 生殖器急性炎症。
- (2) 月经期。

第一节 生殖道细胞学检查

二、检查前准备

1. 检查前评估

(1) 心理评估

(2) 检查时间

检查前24h禁性生活、阴道检查、阴道灌洗及上药等。

第一节 生殖道细胞学检查

2. 物品准备

(1) 留取标本的用具必须无菌干燥

(2) 用物准备

阴道窥器1个、宫颈刮匙2个或细胞刷1个、载玻片若干张、不同型号塑料管、0.9%氯化钠溶液、无菌干燥棉签及棉球、装有固定液标本瓶1个或新柏氏液1瓶、无菌手套。

第一节 生殖道细胞学检查

三、检查中配合

1.体位

膀胱截石位。

2.涂片种类及采集方法

- (1) 阴道涂片：主要目的是了解卵巢或胎盘功能，检测下生殖道感染的病原体。
- (2) 子宫颈刮片：是筛查早期子宫颈癌的方法之一。

第一节 生殖道细胞学检查

- (3) 子宫颈刷片：是目前子宫颈癌筛查的重要方法。
- (4) 子宫颈脱落细胞HPV检测：是子宫颈癌及其癌前病变的筛查方法。
- (5) 宫腔吸片：筛查宫腔内恶性病变，较阴道涂片及诊刮阳性率高。

3.轻、稳、准

4.涂片必须均匀地向一个方向涂抹

第一节 生殖道细胞学检查

四、检查后护理要点

- 1.评估检查后阴道流血情况。
- 2.做好检测样本标记，及时送检。
- 3.说明生殖道脱落细胞检查结果的临床意义。

第一节 生殖道细胞学检查

五、结果评定及临床意义

- 1.评估检查后阴道流血情况。
- 2.做好检测样本标记，及时送检。
- 3.说明生殖道脱落细胞检查结果的临床意义。

第一节 生殖道细胞学检查

2. 生殖道脱落细胞在妇科疾病诊断方面的应用

- (1) 闭经、异常子宫出血、流产等的诊断。
- (2) 推断闭经病变部位、异常子宫出血类型以及流产疗效评价。
- (3) 生殖道感染的病原体种类。

第一节 生殖道细胞学检查

3. 生殖道脱落细胞在妇科肿瘤诊断方面的应用

- (1) TBS分类
- (2) 高危型HPV和低危型HPV

第二节

宫颈活组织检查



第二节 宫颈活组织检查

一、局部活组织检查

二、诊断性宫颈锥形切除术

一、局部活组织检查

（一）适应证与禁忌证

1. 适应证

- (1) 阴道镜诊断为高级别鳞状上皮内病变或可疑癌者。
- (2) 阴道镜诊断为低级别鳞状上皮内病变，但细胞学为不能排除高级别鳞状上皮内病变不典型鳞状细胞或不典型腺上皮细胞及以上、或阴道镜检查不充分或检查经验不足等。
- (3) 阴道镜检查反复出现可疑阳性或阳性者。
- (4) 可疑为宫颈恶性病变或宫颈特异性感染，需进一步明确诊断者。

一、局部活组织检查

2. 禁忌证

- (1) 生殖道患有急性或亚急性炎症者。
- (2) 月经期或有不规则子宫出血者。

一、局部活组织检查

（二）检查前准备

1. 检查前评估

（1）心理评估

（2）阴道炎者应治疗后再取活检

（3）时间 妊娠期、月经期及不规则子宫出血不宜做活检。

（4）签署知情同意书

一、局部活组织检查

2. 物品准备

阴道窥器1个、宫颈钳1把、宫颈活检钳1把、长镊子2把、纱布卷1个、无菌巾1块、棉球及棉签若干、无菌手套1副、复方碘溶液、装有固定液的标本瓶4~6个及消毒液。

一、局部活组织检查

(三) 检查中配合

- 1.膀胱截石位，消毒，铺无菌巾。
- 2.协助医生用干棉球擦净宫颈表面黏液，局部消毒。
- 3.取材部位
 - (1) 鳞-柱交界处；
 - (2) 特殊病变处；
 - (3) 可疑宫颈癌者，3、6、9、12点4处；
 - (4) 阴道镜指导下取材；
 - (5) 碘溶液不着色区。

一、局部活组织检查

4. 棉球或纱布卷局部压迫止血。
5. 组织分别放在标本瓶内，做好标记并及时送检。
6. 为医生传递所需物品，观察病人反应。

一、局部活组织检查

（四）检查后护理要点

1. 评估病人阴道流血。
2. 指导病人术后1个月内禁止性生活、盆浴及阴道灌洗。
3. 提醒病人按要求取病理报告单并及时复诊。

二、诊断性宫颈锥形切除术

（一）适应证与禁忌证

1. 适应证

（1）宫颈细胞学检查多次为高级别鳞状上皮内病变，而宫颈活检为低级别鳞状上皮内病变及以下。

（2）宫颈活检为高级别鳞状上皮内病变而临床可疑为浸润癌，为明确病变累及程度及确定手术范围者。

（3）宫颈活检诊断为原位腺癌。

二、诊断性宫颈锥形切除术

2. 禁忌证

- (1) 生殖道急性或亚急性炎症者。
- (2) 妊娠期或月经期。
- (3) 患血液病有出血倾向者。

二、诊断性宫颈锥形切除术

（二）术前准备

1. 检查前评估

（1）心理评估

（2）时间

用于治疗者应在月经干净后3~7d内进行。

（3）签署知情同意书

二、诊断性宫颈锥形切除术

2. 物品准备

无菌导尿包1个、阴道窥器1个、宫颈钳1把、宫颈扩张器1套、子宫探针1个、长镊子2把、尖手术刀1把（或高频电切仪1台、环形电切刀1把、球形电凝刀1把）、刮匙1把、持针器1把、圆针1枚、可吸收线、棉球及棉签若干、纱布若干、孔巾1块、无菌手套1副、复方碘溶液、标本瓶1个及消毒液。

二、诊断性宫颈锥形切除术

（三）术中配合

1. 排空膀胱，膀胱截石位，消毒、铺无菌孔巾。
2. 协助医生放置阴道窥器，暴露宫颈，消毒阴道和宫颈。
3. 手术过程中及时递送医生所需用物。
4. 做好标记、及时送检。
5. 无菌纱布卷压迫创面止血。
6. 将要行子宫切除者，可行宫颈前后唇相对缝合封闭创面止血；若不能在短期内行子宫切除或无须做进一步手术者，应行宫颈成形缝合术或荷包缝合术，术毕探查宫颈管。

二、诊断性宫颈锥形切除术

（四）术后护理要点

1. 评估病人阴道出血情况。
2. 保持会阴部清洁，抗生素预防感染。
3. 术后休息3d，2个月内禁止性生活及盆浴。
4. 6周后复查，探查宫颈管有无狭窄。



谢 谢 观 看