

妇产科护理



作者:杨迎春 单位:湘潭市妇幼保健院

目录

Content





正常产褥



母乳喂养



产褥期妇女的护理



正常新生儿的护理

导入案例

某女士,32岁, G_1P_0 ,宫内妊娠38周,因规律宫缩4小时入院,6小时后分娩一活男婴,体重3450g,会阴I度裂伤。产后第2天,查体温37.3℃,脉搏74次/分,呼吸19次/分,血压118/76mmHg,宫底平脐,阴道流血鲜红色,量同月经量,会阴水肿,无压痛;出汗多,乳房胀痛,有少量乳汁分泌,哺乳时感下腹部疼痛,因新生儿哭吵,喂奶次数多,休息不好,感焦虑。

请思考:

- 1. 该产妇表现有无异常?
- 2. 该产妇存在的主要护理问题有哪些?
- 3. 如何对该产妇进行护理?

第六章 产褥期妇女的护理



正常产褥



一、定义

产褥期(puerpenrium) 是指从胎盘娩出至产妇全身各器官(除乳腺外)恢复至正常未孕状态所需的一段时期,一般为6周。

二、产褥期妇女的生理变化

- (一) 生殖系统变化
 - 1. 子宫
 - 2. 阴道及外阴
 - 3. 盆底组织

二、产褥期妇女的生理变化

- (二) 乳房的变化
- (三) 血液循环系统变化
- (四)消化系统变化
- (五)泌尿系统变化
- (六) 内分泌系统变化
- (七)腹壁变化

三、产褥期妇女的心理调适

- (一)产褥期妇女的心理变化
- (二) 影响产褥期心理变化的因素
 - 1. 年龄
 - 2. 分娩经历的感受
 - 3. 身体状况
 - 4. 家庭社会支持

三、产褥期妇女的心理调适

- (三)产褥期妇女心理调适
 - 1. 依赖期
 - 2. 依赖-独立期
 - 3. 独立期

第六章 产褥期妇女的护理



产褥期妇女的护理



- 一、临床表现:产褥期的临床表现属于生理性变化。
 - (一) 生命体征
 - (二) 子宫复旧
 - (三) 产后宫缩痛
 - (四) 恶露
 - (五) 褥汗

二、护理评估

- (一)健康史
- (二) 身心状况
 - 1. 生命体征
 - 2. 生殖系统(子宫、会阴、阴道、膀胱)
 - 3. 乳房情况
 - 4. 心理状态和社会支持
 - 5. 辅助检查

三、护理诊断

- 1. 舒适改变 与产后宫缩、会阴部切口、褥汗、疲劳等有关
- 2. 尿潴留 与产时损伤、卧床、活动减少及伤口疼痛有关
- 3. 母乳喂养无效 与母亲知识及技能不足、缺乏信心有关

四、护理目标

- 1. 产妇舒适感增加,能应对疼痛和褥汗,会阴伤口愈合良好。
- 2. 未发生尿潴留。
- 3. 能掌握正确的母乳喂养知识和技能,成功实现母乳喂养。

五、护理措施

- (一)产后常见症状与护理
 - 1. 产后2小时护理
 - 2. 一般护理
- (二)产褥期健康指导
- (三) 产后访视

第六章 产褥期妇女的护理



母乳喂养



一、母乳喂养的好处

- 1. 对婴儿
- 2. 对母亲
- 3. 对社会

二、母乳喂养时间和方法

产后立即行母婴皮肤接触,让婴儿自主寻乳、含乳并完成第一次哺乳,母婴不设限制的频繁哺乳,"婴儿为主导的母乳喂养"。

喂奶姿势:侧躺式、摇篮式、橄榄球式、交叉式、半躺式。

三、乳房的护理

- 1. 一般护理
- 2. 乳头扁平或凹陷
- 3. 乳房胀痛
- 4. 乳头疼痛和皲裂
- 5. 乳汁淤积

三、乳房的护理

- 6. 乳汁淤积乳腺炎
- 7. 增加泌乳
- 8. 退乳护理
- 9. 判断乳汁是否充足
- 10. 母乳储存
- 11. 不宜或暂停母乳喂养指征

第六章 产褥期妇女的护理



正常新生儿护理



一、定义

正常足月新生儿(normal term infant)是指胎龄≥37周<42周,出生体 重≥2500g<4000g,无畸形或疾病的活产婴儿。新生儿期是从出生后断脐到满28日的一段时间。

二、正常新生儿生理特点

- (一) 呼吸系统
- (二) 循环系统
- (三)消化系统
- (四) 泌尿系统
- (五) 血液系统

二、正常新生儿生理特点

- (六) 神经系统
- (七) 免疫系统
- (八) 体温
- (九) 皮肤粘膜

二、正常新生儿生理特点

- (十) 常见的几种特殊生理状态
 - 1. 生理性黄疸
 - 2. "马牙"和"螳螂嘴"
 - 3. 粟粒疹
 - 4. 乳腺肿大和假月经
 - 5. 新生儿红斑

三、正常新生儿护理措施

- 1. 保温
- 2. 保持呼吸道通畅
- 3. 安全管理
- 4. 预防感染
- 5. 皮肤黏膜护理

三、正常新生儿护理措施

- 6. 合理喂养
- 7. 免疫接种
- 8. 新生儿筛查
- 9. 健康教育



谢谢观看