

第七节

三、习题

(一) 选择题

A1 型题

- 1、下列关于颈部肿瘤的描述中，不正确的是（ ）
 - A．颈动脉体瘤位于颈总动脉分叉处颈动脉间隙，可导致颈内外动脉移位，呈杯口状扩大
 - B．颈部海绵状血管瘤多见于婴幼儿，常见于皮下或颈深部，可单发或多发
 - C．若为神经鞘瘤，CT 可显示囊性变和钙化，可以强化
 - D．颈部恶性肿瘤中 80%的为转移瘤，其中 80%来源于头颈部恶性肿瘤
 - E．由于神经纤维瘤血供丰富，可显著强化，以此易与神经鞘瘤鉴别
- 2、颈部肿瘤的患者，N2 期时一般采用（ ）
 - A．颈改良清扫术
 - B．颈全清扫术
 - C．颈择区性清扫术
 - D．颈扩大清扫术
 - E．颈经典型清扫术
- 3、颈部肿瘤取活检时，应遵循的原则是（ ）
 - A．肿瘤原发灶存在时应争取原发灶活检
 - B．可取颈转移淋巴结活检
 - C．取方便手术操作肿块活检
 - D．必须活检所有可能潜在肿瘤部位
 - E．对原发灶周围淋巴结都应取活检
- 4、关于颈部神经源性肿瘤的描述，错误的是（ ）
 - A．颈部神经鞘瘤或神经纤维瘤是颈部常见的良性肿瘤
 - B．CT 上肿瘤多呈类圆形，边界较清楚，CT 平扫与肌组织密度相仿
 - C．肿瘤可有囊变，钙化为其特点
 - D．增强扫描肿瘤有强化，囊变区不强化
 - E．肿块可推移相邻血管出现相应移位

5、颈部良性肿瘤最为常见的有(

) A.神经纤维瘤

B．涎腺混合瘤

C．神经鞘膜瘤

D．脂肪瘤

E．甲状腺肿瘤

6、颈部良性肿瘤发病率最高的是()

A.神经鞘膜

瘤 B．纤维瘤

C．血管瘤

D．甲状腺腺瘤

E．脂肪瘤

7、下列关于脂肪瘤的描述哪项错误 ()

A．脂肪瘤常发生于背肩等皮下组织

B．脂肪瘤常为单发，亦可多发

C．镜下结构与正常脂肪组织相似

D．有包膜，手术易切除

E．脂肪瘤大小很一致，均为 3~5cm 大小

8、关于脂肪瘤，下列描述正确的是 ()

A．脂肪瘤多有明显的症状

B．多发性脂肪瘤有家族史

C．多位于皮内

D．界限多不清楚

E．表面多不光滑

9、脂肪瘤属于 ()

A．良性肿瘤

B．交界性肿瘤

C．恶性肿瘤

D．肿瘤样病变

E．继发性肿瘤

- 10、下列关于表皮样囊肿说法不正确的是 ()
- A . 是一种真皮内含有角质的囊肿
 - B . 好发于青年、儿童
 - C . 通常见于头皮、面部、颈部、躯干及臀部等
 - D . 多发表皮样囊肿见于 Gardner 综合征
 - E . 外伤性表皮样囊肿也多发于头皮、面部、颈部、躯干及臀部等
- 11、有关淋巴瘤，错误的是()
- A . 恶性淋巴瘤常侵犯胸部
 - B . 非霍奇金淋巴瘤侵犯纵隔者较少
 - C . 淋巴结肿大为淋巴瘤的特征性 MR 征象
 - D . 淋巴瘤可累及肺、心包
 - E . 淋巴瘤的淋巴结肿大内很少发生出血性坏死
- 12、对于恶性淋巴瘤，下列哪项不正确 ()
- A.可发生自身免疫性溶血性贫血
 - B . 原发部位可在淋巴结外
 - C . 可转变为白血病
 - D . 霍奇金病常有嗜酸粒细胞增多
 - E . 单独在骨髓中发现 R-S细胞即可诊断
- 13、有关恶性淋巴瘤，下述哪一项是错误的 ()
- A . 恶性淋巴瘤分为霍奇金病和非霍奇金淋巴瘤
 - B . 霍奇金病 60%~90%原发于颈淋巴结
 - C . 霍奇金病有发热、盗汗、食欲不振、体重减轻等全身症状
 - D . 非霍奇金淋巴瘤 60%~90%原发于颈淋巴结
 - E . 非霍奇金淋巴瘤有发热、苍白、疲乏等全身症状
- 14、颈部恶性淋巴瘤好发于()
- A.成年男性
 - B . 成年女性
 - C . 儿童
 - D . 青壮年男性
 - E . 青壮年女性

15、头颈部非霍奇金淋巴瘤颈部淋巴结肿大的特点应除外的是()

- A.明显压痛
- B．进行性增大
- C．质硬
- D．后期常固定，不易活动
- E．早期可活动

16、颈部淋巴结肿大，疑为癌肿转移时，应首先考虑的是 ()

- A.鼻咽癌
- B．食管癌
- C．结肠癌
- D．肺癌
- E．肝癌

17、下咽癌较易发生颈部淋巴结转移，早期常见的转移部位是()

- A．同侧气管旁淋巴结
- B．同侧颈浅淋巴结
- C．同侧锁骨上淋巴结
- D．同侧颈动脉三角区颈深淋巴结
- E．颈前淋巴结

18、颈部转移性肿瘤占颈部恶性肿瘤的()

- A． 1/3
- B． 1/2
- C． 2/3
- D． 3/4
- E． 4/5

19、支持颈部恶性肿瘤的是()

- A．肿块进行性增大，质地硬，无压痛，与周围组织粘连，活动度差
- B．肿块增大迅速，伴有周围组织肿胀、疼痛
- C．无痛性肿块，病史在 2 年以上，质地中等，与周围组织不粘连
- D．位于颈前正中，圆形，质软呈囊性，与周围组织无粘连，可随吞咽而活动
- E．颈部串珠样包块，压痛轻，可活动，晚期可形成经久不愈的窦道

20、颈部恶性肿瘤中，淋巴结转移率约占（ ）

- A. 20%
- B. 30%
- C. 40%
- D. 60%
- E. 80%

A3 型题

(1~2 题共用题干)

患者女，5 岁，因恶性淋巴瘤行化学治疗。化学治疗 6 天后出现发热、腹痛 3 天，少尿 1 天。查体：T39.5℃，P160 次/min，R30 次/min，BP 80/40mmHg；体重 20kg；意识清楚，嗜睡，面色苍白；双肺呼吸音对称，未及啰音；心音有力，律齐；腹软，肝、脾肋下未及，肠鸣音减低；四肢暖，足背动脉搏动可及，四肢肌张力正常，CRT5s。SaO₂95%。

1、急诊应尽快做的处理不包括()

- A. 开放静脉通路
- B. 面罩吸氧(5~10L/min)
- C. 口服普萘洛尔(心得安)
- D. 静脉抗生素
- E. 口服退热药

2、为明确诊断应紧急检查的项目包括()

- A. 动脉血气分析
- B. 骨髓穿刺细胞学检查
- C. 粪常规+隐血试验
- D. 血常规、血糖、血电解质
- E. 血细菌培养

(3~5 题共用题干)

患者，女性，65 岁，确诊为恶性淋巴瘤。

3、对该患者的治疗非最佳选择的药物是()

- A. 美法仑

- B．环磷酰胺
- C．卡莫司汀
- D．塞替派
- E．异环磷酰胺

4、患者进行干细胞移植术，术后进行保护性隔离。下列措施错误的是()

- A．患者应住单间病室隔离
- B．病室内空气应保持正压通风
- C．患呼吸道疾病的医护人员应戴口罩护理患者
- D．未经消毒处理的物品不得带入病室
- E．接触患者前后均应洗手

5、恶性淋巴瘤患者开始治疗前应接受的手术称为 ()

- A．诊断性手术
- B．根治性手术
- C．预防性手术
- D．姑息性手术
- E．重建或康复手术

(6~7 题共用题干)

患者，女性，57 岁，患恶性淋巴瘤，使用抗肿瘤药治疗后，发生血尿。

6、该患者出现抗肿瘤药的不良反应为 ()

- A．出血性膀胱炎
- B．骨髓毒性
- C．胃肠道上皮受损
- D．肺纤维化
- E．贫血

7、如何才能减少该药引起的膀胱炎()

- A．大量饮水
- B．减小给药剂量
- C．合并使用维生素 B
- D．合并使用维生素 K
- E．合并使用抗菌药

(8~10 题共用题干)

某恶性淋巴瘤患者采血处持续渗血，压迫止血效果差，PT，APTT 正常，凝块稳定性试验显示纤维蛋白在 2 小时内完全溶解。

8、以下哪种试验结果会是阳性()

- A. 血浆纤维蛋白原测定
- B. 血浆因子亚基抗原测定
- C. 血小板相关免疫球蛋白检测
- D. VI 因子促凝活性测定
- E. X 因子促凝活性测定

9、该患者可能的并发症是()

- A. DIC
- B. 获得性XIII因子缺乏
- C. ITP
- D. 维生素 K 缺乏症
- E. 先天性XIII因子缺乏

10、以下哪项不属于外科手术治疗恶性淋巴瘤的适应证 ()

- A. 活体组织切除病理检查
- B. 化疗后淋巴结残留
- C. 咽部、喉部恶性淋巴瘤
- D. 纵膈恶性淋巴瘤
- E. 化疗有效控制病情

(二) 填空题

- 1、恶性淋巴瘤是指发生于____和____组织的恶性肿瘤。
- 2、恶性淋巴瘤分为____和____两大类。
- 3、恶性淋巴瘤的发生可能与____和____病毒有关。
- 4、恶性淋巴瘤对____及____治疗都比较敏感，因此应行以____后____为主的综合治疗。
- 5、常见的颈部良性肿瘤有____、____、____和____。

(三) 名词解释

- 1、脂肪瘤

2、表皮样囊肿

3、恶性淋巴瘤

(四) 简答题

1、简述恶性淋巴瘤手术治疗的适应证。

2、简述颈部淋巴结清扫术的适应证。

四、参考答案与解析

(一) 选择题

A1 型题

1	E	2	B	3	A	4	C	5	B	6	D	7	E	8	B	9	A	10	E
11	C	12	E	13	D	14	C	15	A	16	A	17	D	18	D	19	A	20	E

答案解析：

1、神经纤维瘤 CT 为均匀略低密度，增强扫描均匀强化，多数情况下与神经鞘瘤在影像上难以鉴别。

3、活检的原则：肿瘤原发灶存在时应力争取原发灶活检，避免取颈转移淋巴结活检。

A3 型题

1	C	2	B	3	D	4	C	5	A	6	A	7	A	8	B	9	B	10	E
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

答案解析：

4、保护性隔离时，凡患呼吸道疾病或咽部带菌者均应避免接触患者。

8、凝块稳定性试验显示纤维蛋白在 2 小时内完全溶解，表示因子缺乏；进一步可以做定量试验血浆因子亚基抗原测定，结果也应该是阳性。

(二) 填空题

1、淋巴结、结外淋巴组织

2、霍奇金病、非霍奇金淋巴瘤

3、EB、人体嗜 T 淋巴细胞

4、放射治疗、化学药物、放射治疗、化疗

5、颈部神经源性肿瘤、纤维瘤、脂肪粒、表皮样囊肿

(三) 名词解释

- 1、脂肪瘤是一种由成熟脂肪细胞构成的良性肿瘤，可发生于含有脂肪组织的全身任何部位。
- 2、表皮样囊肿为明显或不明显的外伤致表皮基底细胞层进入皮下生长而成的囊肿。囊肿壁由表皮所组成，囊内为角化鳞屑。多见于易受外伤或磨损部位，如臀部、肘部，间或发现于注射部位。
- 3、恶性淋巴瘤是一组起源于淋巴结或其他淋巴组织的淋巴细胞或组织细胞的恶性肿瘤，主要包括霍奇金病及非霍奇金病两大类。

(四) 简答题

- 1、简述恶性淋巴瘤手术治疗的适应证。

(1) 活体组织切除病理检查以明确诊断。

(2) 纵隔恶性淋巴瘤：无表浅淋巴结肿大，穿刺不能明确诊断时，应行纵隔镜检查或手术切除以诊断和治疗，术后作化疗或放疗。有些纵隔淋巴瘤的化疗及放疗疗效不好，应及时转换为手术治疗，术后病理检查以进一步明确或验证诊断。

(3) 化疗后淋巴结残留：放疗后淋巴结大部分消退，而某些部位仍有残留，可将残留的肿大淋巴结切除。

(4) 大多数早期结外淋巴瘤应先手术，后化疗和（或）放疗。

(5) 咽部、喉部恶性淋巴瘤影响呼吸、吞咽功能者，可考虑手术治疗，减轻肿瘤负荷，又改善呼吸、吞咽功能。

- 2、简述颈部淋巴结清扫术的适应证。

(1) 原发灶已经控制或能同时切除，而颈部有淋巴结转移者。口腔癌、喉癌、下咽癌或甲状腺癌往往是原发灶和颈淋巴结清扫术一期完成即所谓的联合根治术。

(2) 有口腔癌、唾液腺癌等分化差的癌肿，即使颈部未扪及肿大淋巴结，也应行预防性颈淋巴结清扫术。颈部转移性淋巴结术前经过非手术治疗后有残留或复发。原发灶不明的颈部淋巴结转移癌（但考虑原发灶可能位于锁骨水平以上）。