

## 第二节

### 三、习题

#### (一) 选择题

##### A1 型题

- 1、观察颈部蜂窝织炎患者时应特别注意下列哪项 ( )
  - A. 呼吸
  - B. 体温
  - C. 神志
  - D. 血压
  - E. 吞咽
- 2、一般性皮下蜂窝织炎的主要致病菌是 ( )
  - A. 金黄色葡萄球菌
  - B. 绿脓杆菌
  - C. 肺炎链球菌
  - D. 结核杆菌
  - E. 大肠杆菌
- 3、口底及颌下的急性蜂窝织炎危及生命的并发症是 ( )
  - A. 颅内化脓性海绵状静脉窦炎
  - B. 喉头水肿, 压迫气管, 呼吸困难, 窒息
  - C. 纵膈化脓感染
  - D. 化脓性心包炎
  - E. 败血症
- 4、颈部急性炎症多表现为( )
  - A. 肿块进行性增大, 质地硬, 无压痛, 与周围组织粘连, 活动度差
  - B. 肿块增大迅速, 伴有周围组织肿胀、疼痛
  - C. 无痛性肿块, 病史在 2 年以上, 质地中等, 与周围组织不粘连
  - D. 位于颈前正中, 圆形, 质软呈囊性, 与周围组织无粘连, 可随吞咽而活动
  - E. 颈部串珠样包块, 压痛轻, 可活动, 晚期可形成经久不愈的窦道
- 5、蜂窝织炎后期脓肿已形成时应行( )
  - A. 抗炎治疗

- B . 抗结核治疗
- C . 抗病毒治疗
- D . 手术治疗
- E . 免疫治疗

6、下列为颈深部组织炎症的是( )

- A . 气管前间隙感染
- B . 颌下淋巴结结核
- C . 颈部梅毒
- D . 炭疽病
- E . 以上都是

7、颈浅部炎症不包括(

) A . 痈

B . 丹毒

C . 蜂窝组织炎

D . 炭疽病

E . 颈淋巴结结核

8、急性淋巴结炎应行( )

A . 抗炎治疗

B . 抗结核治疗

C . 抗病毒治疗

D . 手术治疗

E . 免疫治疗

9、颈深部化脓性蜂窝织炎的临床处理是( )

A . 不可行气管切开

B . 穿刺引流

C . 长期抗生素治疗

D．早期切开彻底引流

E．避免手术治疗

10、原因不明的颈部淋巴结肿大，为明确诊断和进行鉴别诊断，主要的检查是( )

A．X 线胸片、甲状腺核素扫描

B．鼻咽部、喉部检查

C．淋巴结活检

D．血常规、血沉

E．以上都是

11、蜂窝织炎早期应行 ( )

A．抗炎治疗

B．抗结核治疗

C．抗病毒治疗

D．手术治疗

E．保守治疗

12、迷走神经在颈动脉鞘内的位置( )

A．颈内动脉、颈总动脉与颈内静脉的内侧

B．颈内动脉、颈总动脉与颈内静脉之间的前方 C

．颈内动脉、颈总动脉与颈内静脉的外侧

D．颈内动脉、颈总动脉与颈内静脉之间的后方

E．颈内动脉、颈总动脉与颈内静脉之间的上方

13、引起颞间隙感染最可能的来源是 ( )

A．下颌磨牙的根尖周脓肿

B．化脓性扁桃体炎

C．下牙槽神经阻滞麻醉消毒不严

D．颞乳突炎

E．第一前磨牙的根尖化脓性炎症

14、常有翼下颌间隙等感染扩散而来，也可因上颌结节、卵圆孔、圆孔阻滞麻醉时带入感染引起的间隙感染是 ( )

A．颞间隙

B. 眶下间隙

C. 下颌下间隙

D. 颊间隙

E. 颞下间隙

15、颈部蜂窝织炎治疗首选的抗生素是 ( )

A. 青霉素

B. 阿奇霉素

C. 链霉素

D. 红霉素

E. 头孢类

16、触诊检查淋巴结应检查的内容不包括 ( )

A. 淋巴结的部位

B. 淋巴结的大小

C. 淋巴结的活动度

D. 淋巴结的主要功能

E. 淋巴结的质地、有无压痛

17、气管前间隙感染多因 ( ) 继发感染所致

A. 咽旁系炎症

B. 食管前壁或喉外伤性穿孔

C. 牙源性感染

D. 下颌下系感染

E. 颈部蜂窝织炎

18、以下哪项是颈部急性蜂窝织炎应早期切开引流的原因 ( )

A. 避免患者喉头水肿、压迫气管

B. 患者持续高热

C. 患者活动困难

D. 患者疼痛不适

E. 患者舒适度减弱

19、颈动脉鞘内不包括 ( )

- A . 颈总静脉
- B . 颈内动脉
- C . 颈内静脉
- D . 迷走神经
- E . 舌下神经

20、嚼肌间隙上界为 ( )

- A . 下颌骨下缘
- B . 颧弓下缘
- C . 嚼肌前缘
- D . 下颌支后缘
- E . 下颌骨前缘

A3 型题

(1~5 题共用题干)

患者，女，25 岁，因颈部淋巴结肿大变硬入院，患者自觉压痛，无发热，体查发现淋巴结可移动边界清楚，与周围组织无粘连。

1、该患者最有可能的诊断 ( )

- A . 颈部淋巴结炎
- B . 淋巴结核
- C . 恶性淋巴瘤
- D . 颈部转移癌
- E . 下颌下腺炎

2、该患者主要通过 ( ) 检查确诊

- A . 颈部超声
- B . 颈部淋巴结细针抽吸细胞学检查
- C . 颈部 MRI
- D . 颈部 CT
- E . PETCT

3、关于该疾病初期，以下说法错误的是 ( )

- A . 患者需安静休息

- B. 治疗上全身应用抗生素，局部使用物理疗法或用鱼石脂软膏等外敷治疗
- C. 已经化脓者应及时切开引流
- D. 慢性淋巴结炎需要进行手术，寻找病灶，予以清除
- E. 必要时取病灶分泌物做细菌培养

4、该疾病感染来源不包括 ( )

- A. 头、面部皮肤损伤
- B. 头、面部疖、痈 C
- . 上呼吸道感染
- D. 扁桃体炎
- E. 肺炎

5、少儿大多数面颈部淋巴结炎感染来源是 ( )

- A. 牙源性感染
- B. 口腔黏膜感染
- C. 颜面部皮肤损伤
- D. 面部疖痈
- E. 呼吸道感染及扁桃体炎

(6~10 题共用题干)

患者，男，20 岁，患颈部蜂窝织炎，颈部肿胀明显。

6、护士应特别注意观察患者的 ( )

- A. 呼吸
- B. 体温
- C. 神志
- D. 血压
- E. 脉搏

7、该患者需行气管切开，以防患者 ( )

- A. 脓毒血症
- B. 血栓性静脉炎
- C. 纵膈脓肿
- D. 吞咽困难

E. 窒息

8、该疾病主要的致病菌为 ( )

A. 厌氧菌

B. 结核杆菌

C. 溶血性链球菌

D. 肺炎链球菌

E. 金黄色葡萄球菌

9、该病引起的最严重后果是 ( )

A. 败血症

B. 纵隔化脓性感染

C. 吞咽困难

D. 心率减慢

E. 窒息、呼吸困难

10、关于该患者的治疗，以下说法错误的是 ( )

A. 抗菌药物首选青霉素，疑有厌氧菌感染时加用甲硝唑

B. 早期一般性皮下蜂窝织炎可局部敷贴 10%鱼石脂软膏或中药膏剂

C. 产气性皮下蜂窝织炎不需要隔离治疗

D. 颈部急性蜂窝织炎应尽早切开引流

E. 必要时取患者血液或脓液做细菌培养

## (二) 填空题

1、颈部淋巴结炎是主要由\_\_\_\_\_及\_\_\_\_\_病原菌引起的不同部位的感染沿淋巴管侵入相应的区域引起的炎症。

2、急性淋巴结炎初期，局部用\_\_\_\_\_疗法或用\_\_\_\_\_等外敷治疗。

3、颈部蜂窝织炎使用抗菌药物首选\_\_\_\_\_，疑有厌氧菌感染时加用\_\_\_\_\_或\_\_\_\_\_。

4、颈部蜂窝织炎的致病菌主要为\_\_\_\_\_，其次为\_\_\_\_\_。

5、颈淋巴结包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

## (三) 名词解释

1、颈部淋巴结炎

2、颈部蜂窝织炎

#### (四) 简答题

- 1、简述颈部急性蜂窝织炎的护理观察重点。
- 2、简述颈部急、慢性淋巴结炎的饮食护理。

### 四、参考答案与解析

#### (一) 选择题

##### A1 型题

|    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| 1  | A | 2  | A | 3  | B | 4  | B | 5  | D | 6  | A | 7  | E | 8  | A | 9  | D | 10 | E |
| 11 | A | 12 | D | 13 | D | 14 | E | 15 | A | 16 | D | 17 | B | 18 | A | 19 | A | 20 | B |

答案解析：

13、颞间隙感染来源：常由咬肌间隙、翼下颌间隙、颞下间隙和颊间隙感染扩散引起。耳源性感染(化脓性中耳炎、颞乳突炎)、颞部疖痈以及颞部损伤继发感染均可波及颞间隙。

14、颞下间隙感染来源可从相邻间隙，如翼下颌间隙等感染扩散而来；也可因上颌结节、卵圆孔、圆孔阻滞麻醉时带入感染；或由上颌磨牙的根尖周感染或拔牙后感染引起。

##### A3 型题

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
| 1 | A | 2 | B | 3 | D | 4 | E | 5 | E | 6 | A | 7 | E | 8 | C | 9 | E | 10 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|

答案解析：

5、面颈部淋巴结炎以继发于牙源性及口腔感染为最多见，也可来源于颜面部皮肤的损伤、疖、痈等。小儿大多数由上呼吸道感染及扁桃体炎引起。由化脓性细菌如葡萄球菌及链球菌等引起的称为化脓性淋巴结炎；由结核杆菌感染引起的为结核性淋巴结炎。

6、颈部蜂窝织炎可引起喉头水肿而压迫气管，导致呼吸困难甚至窒息。

#### (二) 填空题

- 1、金黄色葡萄球菌 溶血性链球菌
- 2、理 鱼石脂软膏
- 3、青霉素 甲硝唑 替硝唑
- 4、溶血性链球菌 金黄色葡萄球菌

5、颌下淋巴结    颌下淋巴结    颈前淋巴结    颈浅淋巴结    颈深淋巴结

### **(三) 名词解释**

1、部淋巴结炎是主要由金黄色葡萄球菌及溶血性链球菌引起的不同部位的感染沿淋巴管侵入相应的区域引起的炎症。

2、部蜂窝织炎是指颈部疏松结缔组织的急性感染，可以发生在皮下、筋膜下、肌肉间隙或是深部间隙。

### **(四) 简答题**

1、简述颈部急性蜂窝织炎的护理观察重点。

注意观察患者是否发生喉水肿，压迫气管及食管，引起呼吸困难和吞咽困难等症状甚至窒息，及时发现及时对症处理。

2、简述颈部急、慢性淋巴结炎的饮食护理。

饮食清淡，宜低盐、低脂，忌吃生冷、辛辣、油腻等食物，还应戒烟、戒酒；多吃鱼、肉、蛋、蔬菜、水果等富含蛋白质、维生素等营养物质。