

第五节

三、习题

(一) 选择题

A1 型题

- 1、下颌下腺炎的致病菌主要是 ()
 - A. 金黄色葡萄球菌
 - B. 绿脓杆菌
 - C. 乙型溶血性链球菌
 - D. 柯萨奇病毒
 - E. 大肠杆菌
- 2、关于下颌下腺炎的叙述, 哪项是错误的 ()
 - A. 多为涎石造成唾液排出受阻继发感染所致
 - B. 反复发作者下颌下腺可呈硬结性肿块
 - C. 双手触诊应从导管前部向后进行
 - D. 少数涎石 X线片可能不显影
 - E. 腺内涎石需作下颌下腺摘除术
- 3、治疗慢性下颌下腺炎可采用()
 - A. 药物治疗
 - B. 导管冲洗
 - C. 导管扩张
 - D. 导管结扎
 - E. 下颌下腺切除
- 4、下颌下腺炎常见的原因是 ()
 - A. 淋巴结炎
 - B. 冠周炎
 - C. 牙槽脓肿
 - D. 结石阻塞导管
 - E. 血源性感染
- 5、以下不属于临床诊断下颌下腺涎石并发下颌下腺炎的依据是()

- A . 进食时下颌下腺肿胀
- B . 导管口溢脓
- C . 反复肿大, 但与进食无关, 下颌下腺分泌正常
- D . 双手触诊可扪及导管内结石
- E . 进食时下颌下腺疼痛

6、纤维化慢性下颌下腺炎的治疗方法是()

- A . 硬化剂治疗
- B . 导管结扎术
- C . 药物治疗
- D . 摘除涎石
- E . 下颌下腺摘除

7、主要由涎石引起的病变是()

- A . 下颌下腺炎
- B . 慢性复发性腮腺炎
- C . 慢性阻塞性腮腺炎
- D . 舍格伦综合征
- E . 流行性腮腺炎

8、手术后急性下颌下腺炎远较腮腺炎为少的原因是 ()

- A . 下颌下腺分泌液中黏蛋白含量高
- B . 下颌下腺分泌液中抗体含量高
- C . 下颌下腺分泌液中糖成分少
- D . 下颌下腺分泌液中溶菌酶含量高
- E . 下颌下腺唾液分泌量比腮腺大

9、下颌下腺肿瘤的诊断中, 以下哪种是一种准确率较高的定性诊断方法 ()

- A . B 超
- B . CT
- C . 术前活检
- D . 细针吸取活检
- E . MRI

- 10、下颌下腺肿瘤最常见的是()
- A.未分化癌
 - B.鳞癌
 - C.黏液表皮样癌
 - D.淋巴瘤
 - E.腺样囊性癌
- 11、下颌下腺恶性肿瘤最常见的临床表现为()
- A.下颌下肿块
 - B.患侧舌麻木
 - C.局部疼痛
 - D.皮肤破溃
 - E.张口受限
- 12、下颌下腺切除术中可能涉及的重要神经有()
- A.迷走神经
 - B.面神经下颌缘支
 - C.副神经
 - D.下颌神经
 - E.嗅神经
- 13、以下哪项不是下颌下腺切除术的适应症 ()
- A.下颌下腺导管后段接近腺体
 - B.腺内涎石
 - C.下颌下腺恶性肿瘤
 - D.下颌下腺急性炎症期
 - E.下颌下腺囊肿
- 14、以下不属于下颌下腺切除术术后并发症的是 ()
- A.口角歪斜
 - B.舌体麻木
 - C.术后出血
 - D.吞咽困难
 - E.肢体偏瘫

- 15、以下不属于唇动力减弱现象的是 ()
- A . 微笑时患侧嘴角抬高
 - B . 微笑时健侧下唇向下外而露齿
 - C . 微笑时嘴角歪斜
 - D . 微笑时面部痉挛
 - E . 微笑时健侧嘴角抬高
- 16、发出纤维支配泪腺、下颌下腺、舌下腺的神经核是 ()
- A . 动眼神经副核
 - B . 上涎核
 - C . 下涎核
 - D . 迷走神经背核
 - E . 舌下神经核
- 17、下颌下腺的导管开口于 ()
- A . 舌黏膜
 - B . 舌下阜
 - C . 舌扁桃体
 - D . 舌下襞
 - E . 舌上襞
- 18、支配下颌下腺分泌的神经是()
- A . 三叉神经
 - B . 动眼神经
 - C . 展神经
 - D . 舌咽神经
 - E . 面神经
- 19、包被下颌下腺的筋膜是()
- A . 椎前筋膜
 - B . 颈脏器筋膜
 - C . 颈浅筋膜
 - D . 颈深筋膜浅层
 - E . 椎后筋膜

20、下颌下腺由()腺泡构成

- A . 纯浆液腺
- B . 以浆液为主的混合腺体
- C . 以黏液为主的混合腺体
- D . 纯黏液腺
- E . 都不是

A3 型题

(1~5 题共用题干)

女性, 41 岁, 主诉 “左侧颌下区无痛性包块 5 年”就诊, B 超提示为左侧下颌下腺减弱回声包块。左侧颌下可扪及 2.0cm×1.0cm 大小包块, 质硬, 边界清楚, 呈结节状, 轻微活动, 无压痛。入院后 CT 扫描提示左侧下颌下腺见一类圆形等密度病变, 大小约 1.8cm×1.9cm, 边界清楚, 密度均匀, 邻近结构未见侵犯破坏, 未见颌面部、颈部肿大淋巴结。

1、该患者可初步诊断为 ()

- A . 下颌下腺肿瘤
- B . 下颌下腺炎
- C . 下颌下腺结石
- D . 颈部淋巴结炎
- E . 颈部蜂窝织炎

2、进一步鉴别肿瘤的良好性需要进行以下哪项检查 ()

- A . 病理检查
- B . MRI
- C . PETCT
- D . CT
- E . 彩超

3、患者下一步应当如何治疗 ()

- A . 保守治疗
- B . 行下颌下区局部大块切除术
- C . 行下颌下腺及肿瘤切除术
- D . 药物治疗

E. 化疗

4. 关于下颌下腺的描述, 哪项是不正确的 ()

A. 位于颈筋膜浅层所形成的筋膜鞘内

B. 其浅部位于下颌舌骨肌深面

C. 其深部前端发出下颌下腺管

D. 其腺管开口于舌下阜

E. 其腺管走行于下颌舌骨肌和舌骨舌肌之间

5. 以下说法错误的是 ()

A. 下颌下腺肿瘤可行活体组织检查

B. 下颌下腺良性肿瘤的最佳治疗方法为下颌下腺及肿瘤切除术

C. 术后放疗应尽早开始, 最迟不得超过术后 6 周

D. 术中引起的面神经下颌缘支损伤导致口角歪斜

E. 术中引起的舌神经损伤导致舌体麻木

(6~10 题共用题干)

患者, 女, 35 岁。左下颌下腺炎长期反复发作, 双合诊左口底区可触及一硬结

。

6. 为明确是否有结石, 最正确的检查是()

A. 拍牙片

B. B 超检查

C. CT 检查

D. MRI 检查

E. 拍下颌咬合片

7. 患者保守治疗无效, 应采取下列哪项措施()

A. 结石切除

B. 拔除邻近龋坏及松动牙

C. 下颌下腺切除

D. 物理疗法

E. 全身抗生素应用

8. 以下哪项检查可显现导管狭窄或堵塞部位 ()

) A. X 线

B. 下颌下腺导管碘油造影

C. B 超

D. MRI

E. 局部穿刺

9、以下不属于下颌下腺炎的病因的是 ()

A. 下颌下腺导管狭窄

B. 下颌下腺导管堵塞

C. 口底外伤

D. 自身免疫因素

E. 下颌下腺导管扩张

10、主要由涎石引起的病变是 ()

A. 下颌下腺炎

B. 慢性复发性腮腺

炎 C. 慢性阻塞性腮

腺炎 D. 舍格伦综合

征

E. 流行性腮腺炎

(二) 填空题

1、下颌下腺炎的主要致病菌多为_____和_____。

2、下颌下腺肿瘤良性者多为_____，恶性最常见为_____。

3、下颌下腺多形性腺瘤的最佳治疗方式为_____。

4、下颌下腺恶性肿瘤的根治原则为_____。

5、下颌下腺切除术后_____小时取出引流条，_____日拆线。

(三) 名词解释

1、下颌下腺炎

2、下颌下腺肿瘤

(四) 简答题

1、简述下颌下腺切除术的适应症及禁忌证。

2、简述下颌下腺术后面肌康复训练内容。

四、参考答案与解析

(一) 选择题

A1 型题

1	A	2	C	3	E	4	D	5	C	6	E	7	A	8	A	9	A	10	E
11	A	12	B	13	D	14	D	15	C	16	A	17	A	18	A	19	D	20	B

答案解析:

6、下颌下腺涎石病反复发作，使得下颌下腺继发慢性纤维硬化性下颌下腺炎，
出现腺体萎缩。失去摄取和分泌功能时，即使摘除涎石，也已经不能使腺体的功能恢复，可摘除下颌下腺。

10、颌下腺肿瘤中腺样囊性癌最常见，黏液表皮样癌次之。小涎腺癌中以腺样囊性癌最常见。

11、下颌下腺恶性肿瘤大多数病例以下颌下肿块就诊，有时可见面神经下颌缘支或舌下神经受累，半舌麻木或舌局部疼痛。

A3 型题

1	A	2	A	3	C	4	B	5	A	6	E	7	C	8	B	9	E	10	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

答案解析:

6、涎石病是指在腺体或导管内发生钙化性团块沉积而引起的一种疾病，90%发生于下颌下腺。根据进食时下颌下腺肿胀及伴发疼痛的特点，导管口溢脓以及双手触诊可扪及导管内结石等，临床可诊断为下颌下腺涎石并发下颌下腺炎。轻者应作 X 线片检查。下颌下腺涎石应先拍摄下颌横断牙合片及下颌下腺侧位片，在急性炎症消退后，可作唾液腺造影检查，涎石所在处表现为圆形、卵圆形或梭形充盈缺损。所以此题选 E。

(二) 填空题

- 1、金黄色葡萄球菌 绿色链球菌
- 2、多形性腺瘤 腺样囊性癌
- 3、下颌下腺切除
- 4、下颌下区局部大块切除

5、24 5~7

(三) 名词解释

- 1、下颌下腺炎主要是由于局部的导管阻塞和狭窄导致的下颌下腺体局部的发炎。
- 2、下颌下腺肿瘤是

(四) 简答题

- 1、简述下颌下腺切除术的适应症及禁忌证。

(1) 适应症：适用于下颌下腺导管后端接近腺体或腺内涎石，多发性涎石，导管涎石摘除后下颌下腺反复发作肿胀及慢性纤维化下颌下腺，下颌下腺囊肿，以及良性肿瘤，下颌下腺恶性肿瘤。

(2) 禁忌证：下颌下腺急性炎症期。

- 2、简述下颌下腺术后面肌康复训练内容。

加强面肌的运动，如协助患者从病侧的口角向上方用掌根螺旋式按摩面部。指导患者进行康复运动，鼓励患者多锻炼病侧的面肌，并加强表情肌的运动，如多做睁眼、开口笑、撅嘴唇、鼓腮、吹口哨等动作。