

第六节

三、习题

(一) 选择题

A1 型题

- 1、腮腺导管开口于()相对应的颊粘膜上
A . 上颌第一磨牙
B . 上颌第二磨牙
C . 以上均不是
D . 下颌第二磨牙
E 下颌第一磨牙
- 2、位于腮腺浅叶的肿瘤占腮腺肿瘤的 ()
A . 50%
B . 60%
C . 80%
D . 90%
E. 70%
- 3、关于腮腺炎病毒的感染, 哪一项不正确 ()
A . 经呼吸道感染
B . 经血液扩散全是感染
C . 经口腔感染腮腺, 引起腮腺出现病变肿胀
D . 病毒可以感染生殖组织如睾丸或卵巢
E . 腮腺病毒可引起胰腺炎
- 4、关于腮腺的概念, 下列哪项是错误的()
A . 腮腺位于耳屏、下颌角、颧弓所构成的三角区内
B . 正常腮腺体薄而软, 触诊时摸不出腺体的轮廓
C . 腮腺肿大时可见到以耳垂为中心的隆起, 并可触到边缘不明显的包块
D . 腮腺导管位于颧骨下 1.5cm 处, 横过嚼肌表面
E . 腮腺导管开口相当于上颌第十磨牙对面的颊粘膜上
- 5、管理腮腺分泌的神经是()

- A . 舌咽神经
- B . 三叉神经
- C . 面神经
- D . 迷走神经
- E . 舌下神经

6、可用于治疗流行性腮腺炎的药物是 (

) A . 葛根

B . 桂枝

C . 柴胡

D . 细辛

E . 麻黄

7、急性腮腺炎儿无明显并发症，最适宜的隔离方式是()

A . 接触隔离

B . 血液隔离

C . 肠道隔离

D . 呼吸道隔离

E . 保护性隔离

8、腮腺恶性肿瘤患者手术切除面神经后，引起咀嚼后食物滞留于口腔前庭，可能损伤的肌是()

A . 咬肌

B . 翼内肌

C . 颞肌

D . 颊肌

E . 翼外肌

9、下述哪些征象提示腮腺肿瘤为恶性可能()

A . 肿瘤外形规则，呈圆形

B . 肿瘤中心坏死，显示低密度区或浓淡不均

C . 肿块边界光滑，增强扫描均匀强化

D . 肿块边界清晰

E . 肿块边界模糊

10、对于“流行性腮腺炎”患者密切接触的弟弟，正确的做法是()

- A . 不需要采取任何措施
- B . 同时住院治疗
- C . 检疫4 周
- D . 抗病毒治疗
- E . 注射特异性高效价免疫球蛋白

11、腮腺肿瘤术后几天伤口拆线 (

) A . 5 天

B . 7 天

C . 14 天

D . 15 天

E . 21 天

12、以下哪项不属于腮腺肿瘤术后常见的并发症 ()

- A . 涎腺痿
- B . 面神经麻痹
- C . 味觉出汗综合征
- D . 倾倒综合征
- E . 局部凹陷畸形

13、腮腺导管其体表投影为()

A . 鼻翼和口角至耳屏间切迹连线的上 1/3 段的连线
B . 鼻翼和口角至耳屏间切迹连线的中 1/3 段的连线
C . 鼻翼和口角至耳屏间切迹连线的下 1/3 段的连线

D . 鼻翼和口角至耳屏间切迹连线的上 2/3 段的连线

E . 鼻翼和口角至耳屏间切迹连线的下 2/3 段的连线

15、不属于腮腺肿瘤常用的诊断方法有(

-) A . 腮腺增强 CT
- B . 腮腺 MRI
- C . 切开活检明确肿瘤性质

D . 腮腺 B 型超声

E . 细针穿刺活检

15、容易沿神经生长扩散的腮腺肿瘤是()

A . 腺淋巴瘤

B . 黏液表皮样癌

C . 恶性混合瘤

D . 腺泡细胞癌

E . 腺样囊性癌

16、腮腺手术时的相关解剖描述中，不正确的是()

A . 以下颌角下方的面后静脉为标志解剖下颌缘支

B . 以耳大神经为标志解剖颞支

C . 以腮腺导管为标志解剖颊支

D . 以颧弓为标志解剖颧支

E . 在乳突尖与外耳道底壁之间寻找面神经主干

17、下列对腮腺肿瘤的描述，错误的是 ()

A . 腮腺良性肿瘤较恶性肿瘤多见

B . 腮腺腺淋巴瘤是最常见的腮腺良性肿瘤

C . 腮腺混合瘤CT 可表现为腮腺类圆形或椭圆形软组织肿块，边缘光滑

D . 腮腺腺淋巴瘤 T1WI 和 T2WI 均可呈高信号

E . 在超声检查中，腮腺混合瘤可显示均匀实性回声中有细小的蜂窝状结构

18、下述哪些征象不提示腮腺肿瘤为恶性可能 ()

A . 肿块境界不清，呈弥漫性浸润

B . 肿瘤中心坏死，显示低密度区或浓淡不均

C . 颈部淋巴结肿大

D . 肿块边界光滑，增强扫描均匀强化

E . 无淋巴结转移，无面神经侵犯症状

19、关于腮腺肿瘤的描述下列错误的是()

A . 手术治疗为主

B . 可以活体组织活检以定性

C . 可辅以放疗

D．具有家族倾向

E．发生部位以浅叶多见

20、CT 诊断腮腺肿瘤，下列叙述正确的是（ ）

A．恶性肿瘤在CT 上具有明确的特征

B．恶性肿瘤一般表现为无包膜、浸润性生长

C．腮腺恶性肿瘤因血供丰富，不易坏死

D．腮腺恶性肿瘤一般不出现转移

E．应用 CT 技术较容易区分良性和恶性肿瘤

瘤 A3 型题

(1~3 题共用题干)

女性，40 岁，左耳下肿物 5 年。检查：左耳下 2cm 肿物，结节状，硬，活动。

1、若考虑为腮腺肿瘤，最常见的病理类型为()

A．腺样囊性癌

B．黏液表皮样癌

C．恶性混合瘤

D．腮腺混合瘤

E．腺淋巴瘤

2、该患者应采用的手术方式为()

A．腮腺浅叶切除面神经解剖

B．肿瘤局部切除

C．腮腺面神经切除

D．全腮腺切除面神经解剖

E．腮腺加下颌骨切除

3、该患者的术后辅助治疗为()

A．放疗

B．生物治疗

C．热疗

D．化疗

E．无需辅助治疗

(4~8 题共用题干)

某患者因右侧腮腺区恶性肿瘤，行局部扩大切除及胸大肌皮瓣修复加面神经解剖术，其术区未与口腔相通。

4、近日术前家属签字时，谈话中以下哪项是不必要的（ ）

- A. 术后可能出现面瘫
- B. 耳垂麻木
- C. 涎瘘
- D. Frey 综合征
- E. 可能出现同侧下颌骨麻木

5、创口缝合后关于其引流物的放置（ ）

- A. 不必放置引流物，加压包扎即可
- B. 应放置引流物 24~48 小时引流，必要时延至 72 小时以上
- C. 暂不放置引流物，以后根据创口愈合情况考虑是否放置引流物
- D. 引流物放置于皮下即可，不必置于较深层部位
- E. 引流物可从任意角度放入，不考虑重力和体位因素

6、此创口的类型属于（ ）

- A. 污染创口
- B. 延期愈合创口
- C. 感染创口
- D. 无菌创口
- E. 一期愈合创口

7、创口的术后处理，应该是（ ）

- A. 每日至少打开一次敷料观察创口情况
- B. 拔除引流物后，拆线前至少还要换药两次
- C. 一般不宜打开敷料观察，但其创口可早期暴露
- D. 主要根据患者的主观感觉，判断是否存在感染
- E. 无明显的感染现象，不必全身预防性使用抗生素

8、创口未发生感染，其拆线应该在术后（ ）

- A. 4 天
- B. 5 天全部拆完
- C. 5 天间断拆线，至 7 天拆完

D . 8~10 天拆除

E . 由于行组织瓣修复组织，拆线延长至 14 天

(9~10 题共用题干)

患者，男性，腮左侧腮腺淋巴瘤，行左腮腺部分腺体加肿瘤切除术，术后3 天发现患者不能鼓气，口角歪斜，其余无异常。

9、可能原因是术中损伤了 ()

A . 面神经总干

B . 面神经颞支与颧支

C . 面神经颊支与颧支

D . 面神经上下颊支

E . 面神经颞支和下颌缘支

10、下列哪一种腮腺肿瘤较易侵犯面神经 ()

A . 黏液表皮样瘤

B . 腺样囊性癌

C . 腺淋巴瘤

D . 腮腺混合瘤

E . 淋巴管瘤

(二) 填空题

1、腮腺炎分为____、____和____三类。

2、急性化脓性腮腺炎最常见的致病菌是____，少数为____。

3、保留面神经的腮腺肿瘤切除术术后并发症包括____、____、____和____。

4、腮腺肿瘤很少波及____、____、____和____四对脑神经。

5、最常见的腮腺肿瘤是____。

(三) 名词解释

1、腮腺炎

2、腮腺肿瘤

(四) 简答题

1、简述腮腺脓肿切开引流的手术指征。

2、腮腺肿物的良恶性如何鉴别？

四、参考答案与解析

(一) 选择题

A1 型题

1	A	2	C	3	A	4	A	5	B	6	E	7	A	8	A	9	B	10	E
11	B	12	D	13	B	14	E	15	C	16	B	17	B	18	D	19	B	20	B

答案解析:

13、腮腺导管：由腮腺前缘发出，在颧弓下方一横指处，向前横行越过咬肌的表面，至咬肌前缘，穿颊肌，开口于上颌第二磨牙相对处的颊黏膜上。其体表投影为：鼻翼和口角至耳屏间切迹连线的中 1/3 段的连线。

14、腮腺腺样囊性癌临床表现为眼球突出并向内下方移位由于肿瘤浸润血管、神经及骨组织和眼外肌所导致的疼痛麻木、上睑下垂和复视较多见，疼痛是主要临床症状。可触及眶缘的粘连性肿块，边界不清可有压痛。

16、颞支位于耳前、上，而耳大神经位于耳后、下。

A3 型题

1	D	2	D	3	A	4	E	5	B	6	A	7	C	8	C	9	E	10	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

答案解析:

2、腮腺肿瘤可见耳垂或耳前区的类圆形或结节状肿块，活动，质地中等，无触痛，生长缓慢，多为良性肿瘤；反之，肿瘤生长迅速，肿块外形不规则，质硬，固定，与周围组织粘连且伴有疼痛、面瘫或出现颈淋巴结转移者，则多为恶性肿瘤。

瘤。外科手术是治疗腮腺肿瘤最有效的方法，手术后仍需放疗。

4、腮腺肿物切除加面神经解剖术的手术全过程不涉及三叉神经所走行的部位和区域。

7、因创口范围大，有可能造成血肿及污染，故应该放置引流 1~2 天，必要时延时至 72 小时，经缝合后的污染伤口，除为拔除引流或怀疑创口有感染时，一般不宜打开敷料观察。

(二) 填空题

1、急性化脓性腮腺炎 慢性化脓性腮腺炎 流行性腮腺炎

- 2、葡萄球菌 链球菌
- 3、面神经麻痹 腮腺瘻 耳垂麻木 耳颞神经综合症
- 4、舌咽神经 迷走神经 副神经 舌下神经
- 5、多形性腺瘤

(三) 名词解释

- 1、腮腺炎是由腮腺病毒引起的呼吸道传染病，主要表现为腮腺肿大、胀痛。
- 2、腮腺肿瘤是发生在腮腺的良性和恶性肿瘤的总称。

(四) 简答题

- 1、简述腮腺脓肿切开引流的手术指征。

经药物及其他保守治疗无效，患者有持续性高热，白细胞总数增高，局部有 明显的凹陷性水肿；出现跳痛并有局限性压痛点；腮腺导管口有脓液排出，但不 畅；腮腺穿刺有脓者；均为切开引流的手术指征。

- 2、腮腺肿物的良恶性如何鉴别？

腮腺良性肿瘤除了可触及肿块之外，大多无自觉不适；腮腺恶性肿瘤生长 较快，肿物大多形状不规则，质地较硬，界限不清，与周围组织可有粘连，导致 肿物不易被推动，多伴有压痛，可伴有自发性疼痛。病理诊断是鉴别腮腺肿瘤良 恶性的金标准。