

第六章 第三节

三、习题

(一) 选择题

A1 型题

- 1、下面关于声门型癌的临床表现描述错误的是（ ）
 - A. 早期症状不明显
 - B. 可引起呼吸困难
 - C. 不易向颈淋巴结转移
 - D. 预后较好
 - E. 声嘶
- 2、最早期的声门癌的症状是（ ）
 - A. 呼吸困难
 - B. 吞咽困难
 - C. 声音嘶哑
 - D. 咽喉疼痛
 - E. 颈淋巴结转移
- 3、喉癌中常有气管前或气管旁淋巴结转移的是（ ）
 - A. 声门上型癌
 - B. 声门型癌
 - C. 声门下型癌
 - D. 声门旁型癌
 - E. 以上都没有
- 4、声门上型喉癌的早期症状是（ ）
 - A. 咽喉疼痛，吞咽时疼痛加重
 - B. 咳嗽，痰中带血
 - C. 声音嘶哑
 - D. 仅有喉部不适感或异物感
 - E. 呼吸困难
- 5、喉癌中预后最好的是（ ）

- A. 声门上型癌
 - B. 声门型癌
 - C. 声门下型癌
 - D. 声门旁型癌
 - E. 喉部继发性癌
- 6、喉镜检查见喉癌的形态是（ ）
- A. 菜花型
 - B. 溃疡型
 - C. 结节型
 - D. 包块型
 - E. 以上都是
- 7、喉癌最常发生于（ ）
- A. 会厌
 - B. 喉室
 - C. 室带
 - D. 声带
 - E. 声门下
- 8、治疗喉癌的主要手段是（ ）
- A. 手术治疗
 - B. 放射治疗
 - C. 化学药物治疗
 - D. 免疫治疗
 - E. 生物治疗
- 9、喉癌的确诊有赖于（ ）
- A. 间接喉镜检查
 - B. 直接喉镜检查
 - C. 纤维喉镜检查
 - D. 喉部 CT 及 MRI 检查
 - E. 喉部活检

- 10、不是喉癌前期病变的选项是（ ）
- A. 喉角化症
 - B. 喉白斑病
 - C. 喉淀粉样变
 - D. 成人型喉乳头状瘤
 - E. 成人型慢性肥厚型喉炎
- 11、喉部最常见的良性肿瘤是（ ）
- A. 声带息肉
 - B. 声带小结
 - C. 喉乳头状瘤
 - D. 喉血管瘤
 - E. 喉神经纤维瘤
- 12、在治疗小儿头乳状瘤时，最常用的方法是（ ）
- A. CO₂激光手术切除
 - B. 干扰素
 - C. 光动力学治疗
 - D. 自体疫苗
 - E. 喉切除术
- 13、下面关于诊断喉癌的最可靠方法是（ ）
- A. 纤维喉镜
 - B. 喉 CT 检查
 - C. 组织活检
 - D. 病史演变
 - E. MRI 检查
- 14、描述成人喉乳头状瘤的特点正确的为（ ）
- A. 与生殖器尖锐湿疣有关
 - B. 常为多发性
 - C. 容易发生喉阻塞
 - D. 有恶变可能

E. 不易复发

15、对喉乳头状瘤的描述，不正确的是（ ）

- A. 喉乳头状瘤是喉部的非上皮性良性肿瘤
- B. 喉乳头状瘤可发生于任何年龄，以 10 岁以下儿童多见
- C. 儿童的喉乳头状瘤随年龄增长有自限趋势
- D. 成人喉乳头状瘤有癌变可能
- E. 治疗喉乳头状瘤首选喉镜下摘除瘤体

16、儿童喉乳头状瘤的常见症状是（ ）

- A. 进行性声音嘶哑
- B. 喉鸣
- C. 呼吸困难
- D. 喉阻塞
- E. 以上都是

17、与喉乳头状瘤发病无关的是（ ）

- A. 病毒感染
- B. 细菌感染
- C. 母亲生殖器尖锐湿疣
- D. 慢性炎症刺激
- E. 内分泌因素

18、喉的癌前期病变是（ ）

- A. 喉白斑病
- B. 喉角化症
- C. 成人型慢性肥厚性喉炎
- D. 成人型喉乳头状瘤
- E. 以上都是

19、喉癌最常见的病理类型是（ ）

- A. 鳞状细胞癌
- B. 腺癌
- C. 未分化癌

- D. 基底细胞癌
- E. 淋巴上皮癌

20、喉癌的发生()

- A. 以声带癌居多，声门上型癌次之，声门下型癌极少见
- B. 以声带癌居多，声门下型癌次之，声门上型癌极少见
- C. 以声门上型癌居多，声带癌次之，声门下型癌极少见
- D. 以声门上型癌居多，声门下型癌次之，声带癌极少见
- E. 以声门下型癌居多，声门上型癌次之，声带癌极少见

A3 型题

(1~4 题共用题干)

患者，男性，56 岁，大专学历，家庭幸福，妻子和儿子均体健。有吸烟史 30 年，每天约 20 支，经常饮酒应酬，生活不规律。平日体健，性格开朗，较固执，半年前出现声嘶，未予重视，近 1 个月声嘶加重，伴活动后呼吸困难，即到医院就诊，经检查诊断为喉癌。

1、该患者的治疗的主要方法是()

- A. 手术治疗
- B. 放射治疗
- C. 化学药物治疗
- D. 免疫治疗
- E. 生物治疗

2、该患者的喉癌发生部位在()

- A. 会厌
- B. 喉室
- C. 室带
- D. 声带
- E. 声门下

3、该患者行喉镜检查见喉部出现()形态。()

- A. 菜花型
- B. 溃疡型

- C. 结节型
- D. 包块型
- E. 以上都是

4、现该患者首要护理诊断问题是（ ）

- A. 有窒息的危险 与肿瘤压呼吸道有关
- B. 有营养失调的危险 低于机体需要量
- C. 焦虑 与疾病知识缺乏有关
- D. 吞咽障碍

(5~7 题共用题干)

5、男，74 岁，咽喉部不适一年余，近两三个月咽喉疼痛，吞咽困难，进行性声嘶、咯血或痰中带血，最可能诊断是（ ）

- A. 喉癌
- B. 会厌癌
- C. 声带癌
- D. 扁桃体癌
- E. 肺癌

6、该患者首要护理诊断是（ ）

- A. 有窒息的危险 与肿瘤压呼吸道有关
- B. 有营养失调的危险 吞咽障碍
- C. 焦虑 与疾病知识缺乏有关
- D. 疼痛

7、该患者首要护理措施是（ ）

- A. 气管切开术
- B. 向患者讲解该疾病的治疗方法
- C. 插胃管，鼻饲营养物质
- D. 雾化吸入

(8~1 题共用题干)

患者男性，3 岁，因“进行性声嘶伴呼吸困难 2 年”来诊。患儿 1 岁后出现哭闹时声音沙哑，按“喉炎”在当地治疗，未见明显好转声嘶加重，并出现呼吸

困难，进行性加重，夜间重，有憋醒，不能平卧睡觉。轻咳，呼吸急促，哭闹时加重，食欲减退。提示儿童纤维喉镜：喉腔内可见黏膜轻度充血声门区多发乳头状瘤样肿物，声门裂看不清。血常规：白细胞 $5 \times 10^{10}/L$ ，红细胞 $4.26 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白 $122g/L$ ，血小板 $305 \times 10^9/L$ 。肝功能正常，HBsAg (-)，尿常规正常，胸部 X 线片：双肺纹理增粗，未见阴影，胸腺不大。

8、该患儿初步诊断为 ()

- A. 先天性喉蹼
- B. 喉癌
- C. 声带息肉
- D. 肺炎
- E. 喉乳头状瘤

9、目前应对患儿采取的措施错误的是 ()

- A. 即刻行气管切开术
- B. 请儿科会诊
- C. 胸部 X 线片
- D. 避免剧烈活动及哭闹
- E. 儿童纤维喉镜检查

10、目前对于该患儿的最佳治疗方法是 ()

- A. 气管切开
- B. 注射干扰素
- C. 有色激光光电治疗
- D. 全身应用糖皮质激素
- E. 显微喉镜下激光切除术

(二) 填空题

- 1、喉癌首选的治疗手段是_____，主要方式有_____和_____。
- 2、气管切开术后拔管时应先堵管的时间为_____。
- 3、小儿喉乳头状瘤最易发生于_____，呈蓬松绒毛状或菜花状向_____或_____蔓延。
- 4、喉部恶性肿瘤分_____和_____两种，原发性肿瘤中主要为_____，约

占 90% 以上。

5、喉癌症状以 _____、_____、_____、_____及颈淋巴结转移为主。

(三) 名词解释

- 1、癌前病
- 2、干扰素
- 3、跨声门癌
- 4、喉乳头状瘤

(四) 简答题

- 1、喉乳头状瘤的临床表现有哪些？
- 2、简述喉癌的主要分型与主要治疗方法？
- 3、简述喉癌的临床表现？

四、参考答案与解析

(一) 选择题

A1 型题

1	A	2	C	3	C	4	D	5	B	6	E	7	D	8	A	9	E	10	C
11	C	12	A	13	C	14	B	15	A	16	E	17	B	18	E	19	A	20	A

答案解析：

3、声门型喉癌初起为发声易倦或声嘶，无其他不适，常未受重视，多误认为“感冒”、“喉炎”，特别是以往常有慢性喉炎病史者。因此，凡 40 岁以上，声嘶超过 2 周，经发声休息和一般治疗不改善者，必须仔细作喉镜检查。固本题选 C。

A3 型题

1	A	2	D	3	A	4	A	5	A	6	B	7	C	8	E	9	A	10	E
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

(二) 填空题

- 1、手术 喉部分切除术 喉全切除术
- 2、24~48 小时
- 3、声带上、喉前庭、声门下腔
- 4、原发性、继发性、鳞状细胞癌
- 5、声嘶、呼吸困难、咳嗽、吞咽困难

（三）名词解释

- 1、是指一类比正常黏膜更易发生癌变（但非必然）的疾病。包括喉角化病喉黏膜白斑病、喉厚皮病、成人喉乳头状瘤和慢性肥厚性喉炎。
- 2、又称病毒抑制因子，是由某些物质(如病毒等)作用于细胞后，诱导细胞产生的广谱抗病毒物质。目前主要有三种干扰素即人白细胞干扰素、人成纤维细胞干扰素和类淋巴细胞 F 扰素。
- 3、又称贯声门癌是指原发于喉室的癌肿，跨越两个解剖区域，即声门上区和声门区。早期可无症状，其临床特点是：声嘶为首发症状，常先有声带固定而未窥及肿瘤，一般常发展指两个区时，才得到确诊。
- 4、是喉部最常见的良性肿瘤。喉乳头状瘤的性别差异不大，可发生于任何年龄 10 岁以下儿童更为常见。最易发生于声带上，呈蓬松绒毛状或菜花状向喉前庭或声门下腔蔓延。

（四）简答题

- 1、喉乳头状瘤的临床表现有哪些？

喉乳头状瘤常见症状为声嘶或失声。肿瘤大者，可引起咳嗽，喘鸣及呼吸困难。长期持续性呼吸困难者，可发生漏斗胸及代偿性红细胞增多。喉镜检查见肿瘤呈苍白、淡红或暗红色，视血管的多寡及有无继发感染而定。表面常呈桑葚状或仅粗糙不平如绒毛而无乳头可见。带蒂者常随呼吸气流上下活动，安静呼吸时可隐入声门下腔不易发现，发声时则翻于声带上清晰可见。

- 2、简述喉癌的主要分型与主要治疗方法？

（1）根据癌肿发生部位，喉癌分为声门上型、声门型、声门下型和声门旁型。

（2）手术治疗：依据喉癌的分型分期，可采用垂直半喉、水平半喉、全喉切除术。

- 3、简述喉癌的临床表现？

（1）声门上型：为原发于声带以上部位的癌肿。此型癌肿分化差，发展快。早期症状仅觉喉部有异物感，咽部不适。癌肿表面溃烂时，则有咽喉痛。晚期癌肿瘤侵蚀血管，则痰中带血，常有臭痰咳出；侵及声带，则有声嘶、呼吸困难等症。

(2)声门型：局限于声带的癌肿，以前、中 1/3 处多见，分化较好，发展较慢，主要症状为声嘶，进行性加重，肿瘤增大时，阻塞声门，可出现喉喘鸣和呼吸困难，晚期有痰中带血症状。

(3)声门下型：为发生于声带以下、环状软骨下缘以上部位的癌肿。该区较为隐匿，不易在常规喉镜检查中发现。早期可无症状，以后则有咳嗽、痰中带血。晚期声门下区被癌肿堵塞，导致呼吸困难。

(4)声门旁型：指原发于喉室的癌肿，易向外侧声门旁间隙扩散，也称贯声门癌，该区身为隐蔽，早期可无症状。声嘶为首发症状，常先有声带固定，而未窥及肿瘤一般常发展至两个区时，才得到确诊。