

第七节

三、习题

(一) 选择题

A1 型题

- 1、发生于鼻腔鼻窦的骨瘤最常见于 ()
 - A. 额窦
 - B. 上颌窦
 - C. 鼻中隔
 - D. 筛窦
 - E. 蝶窦
- 2、下列鼻腔鼻窦恶性肿瘤中，不提倡活检的是 ()
 - A. 嗅神经母细胞瘤
 - B. 鳞状细胞癌
 - C. 恶性黑色素瘤
 - D. 恶性淋巴瘤
 - E. 腺样囊性癌
- 3、关于鼻内翻性乳头状瘤的影像学特征，叙述错误的是 ()
 - A. CT 表现为单侧鼻腔鼻窦内的结节状、条索状或不规则形软组织影
 - B. CT 表现为气泡征，是其特征性表现
 - C. 肿瘤组织在 MRI 的 T1WI 表现为中等信号
 - D. 肿瘤组织在 MRI 的 T2WI 表现为中等或稍高信号
 - E. 增强 MRI 表现为肿瘤组织不强化
- 4、鼻窦黏液囊肿最常见于 ()
 - A. 上颌窦
 - B. 额窦
 - C. 筛窦
 - D. 蝶窦
 - E. 前组筛窦
- 5、切除鼻前庭囊肿的手术进路多采用 ()

- A. 唇龈沟横切口进路
- B. 鼻前庭横切口进路
- C. 鼻侧切口进路
- D. 鼻前庭纵切口进路
- E. 鼻前庭横切口进路

6、蝶窦囊肿的眶周出现皮肤感觉障碍，眼睑下垂，眼球固定，失明时应考虑是（ ）

- A. 球后视神经炎
- B. 眶尖综合征
- C. 眶内蜂窝织炎
- D. 海绵窦血栓性静脉炎
- E. 面神经损坏

7、额、筛窦脓囊肿的首选治疗方法是（ ）

- A. 抗生素治疗
- B. 脓囊肿穿刺术
- C. 额窦环钻术
- D. 鼻内镜额、筛窦开放术
- E. 不用任何治疗

8、最易侵犯颅内和眶内引起相应症状的囊肿是（ ）

- A. 鼻窦黏液囊肿
- B. 鼻窦浆液囊肿
- C. 鼻窦黏膜下囊肿
- D. 鼻前庭囊肿
- E. 鼻后囊肿

9、蝶窦黏液囊肿时鼻镜检查可见（ ）

- A. 鼻顶下塌
- B. 中鼻道向下移位
- C. 嗅沟饱满
- D. 面颊部隆起

E. 筛泡向下移位

10、鼻窦黏液囊肿其骨质破坏是因为 ()

A. 囊液腐蚀所致

B. 囊肿呈侵袭性生长

C. 囊肿压迫和骨壁中的破骨细胞被激活有关

D. 骨壁中的成骨细胞被激活

E. 骨壁中的软骨细胞被激活

11、蝶窦黏液囊肿侵犯眶内引起 ()

A. 眼球突出

B. 眼球向外移位

C. 眼球向外上移位

D. 眼球向外下移位

E. 眼球向内下移位

12、鼻窦囊肿包括 ()

A. 黏液囊肿

B. 黏膜下囊肿

C. 浆液囊肿

D. 滤泡囊肿

E. 以上都是

13、较大的蝶、筛窦囊肿或脓肿可引起 ()

A. 脑脊液鼻漏

B. 眶尖综合征

C. 眼球突出

D. 球后视神经炎

E. 以上都是

14、鼻窦黏液囊肿的临床表现可有 ()

A. 流泪

B. 上睑下垂

C. 嗅觉减退

- D. 偏头痛
- E. 以上都是

15、鼻窦黏液囊肿形成的原因有 ()

- A. 鼻窦自然开口完全阻塞后致窦内分泌物潴留而逐渐形成的
- B. 由迷走神经的上皮细胞发展而来
- C. 黏膜内黏液腺阻塞，腺体分泌物潴留而逐渐形成
- D. 胚胎期球状突和上颌突融合部残留
- E. 长期的炎症刺激

16、额窦囊肿侵犯破坏其后壁时出现的特异性体征是 ()

- A. 可触及与心律一致的波动
- B. 波特隆起
- C. 瞳孔散大
- D. 眼球向下移位
- E. 眼球向上移位

17、关于鼻内翻性乳头状瘤，叙述错误的是 ()

- A. 是来源于鼻腔鼻窦黏膜上皮的常见的良性肿瘤
- B. 多数患者出现涕中带血，单侧鼻塞进行性加重
- C. 该疾病呈破坏性生长，病情进展迅速
- D. 该疾病在生长过程中骨质破坏明显，一般不诱发鼻窦骨质增生和硬化
- E. 治疗首选手术切除，术后易复发及恶变，但不宜选择放射治疗

18、鼻腔及鼻窦最常见的良性肿瘤是 ()

- A. 乳头状瘤
- B. 腺瘤
- C. 血管瘤
- D. 骨瘤
- E. 淋巴管瘤

19、鼻腔良性肿瘤中易复发、易恶变的是 ()

- A. 血管瘤
- B. 内翻性乳头状瘤

- C. 腺瘤
- D. 骨瘤
- E. 纤维瘤

20、鼻腔及鼻窦血管瘤以下列哪种治疗方法为主 ()

- A. 手术切除
- B. 放射治疗
- C. 化疗
- D. 硬化剂注射
- E. 激光或冷冻治疗

A3 型题

(1~5 题共用题干)

患者男，18 岁，阵发性鼻腔出血，伴有鼻塞、流涕 2 年入院。查体：体温 36.7℃，呼吸 20 次/分，脉搏 82 次/分，血压 123/78mmHg，鼻咽部可见一分叶状红色肿物，表面光滑而富有血管。查血尿常规均未见明显异常。

1、该患者最可能的诊断是 ()

- A. 后鼻孔出血性息肉
- B. 腺样体肥大
- C. 鼻咽纤维血管瘤
- D. 鼻咽癌
- E. 颅咽管瘤

2、该患者禁忌采用的检查为 ()

- A. 鼻咽触诊
- B. CT
- C. MRI
- D. DSA
- E. 肿物活检

3、对了解肿瘤影响范围，骨质破坏程度最有价值的检查项目是 ()

- A. CT 或 MRI
- B. B 超

C. DSA

D. 纤维鼻咽镜检查

E. 鼻咽活检

4、为了解鼻咽部肿瘤的血液供应情况，最有价值的检查是（ ）

A. CT

B. 电子纤维鼻咽镜

C. DSA

D. PET-CT

E. B 超

5、该患者采用的手术路径为（ ）

A. 硬腭进路加颊侧切口

B. 鼻腔进路

C. 颅颌联合进路

D. 硬腭进路

E. 口咽进路

(6~10 题共用题干)

患者，男，14 岁，以左侧鼻腔反复出血 1 年，左侧渐进性鼻塞 3 个月就诊。患者无耳鸣、听力下降，无外伤史。

6、电子鼻咽镜检查见鼻咽部偏左侧有一红色新生物，几乎堵塞左侧后鼻孔，并有部分突入鼻腔，为确定诊断下列采用的措施不恰当的是（ ）

A. 可行鼻咽部 CT 及增强扫描

B. 可行鼻咽部 MRI 及增强扫描

C. 可在间接鼻咽镜下鼻咽新生物活检

D. 可在鼻内镜下穿刺抽吸检查是否有血性液体

E. 可行颈动脉造影检查

7、通过上述措施已诊断为鼻咽血管纤维瘤，下列治疗措施错误的是（ ）

A. 硬腭进路肿瘤切除术

B. 鼻内镜下肿瘤切除术

C. 先局部注射血管硬化剂，待肿瘤缩小后再进行手术

- D. 先进行放疗，再行手术治疗
- E. 可先行颈内动脉结扎，再进行手术治疗
- 8、为明确诊断，下列采用的措施不恰当的是（ ）
- A. 间接鼻咽镜检查鼻咽部是否有新生物
- B. 电子鼻咽镜检查鼻咽部
- C. 鼻咽及鼻窦 CT 检查
- D. 抽血查 EB 病毒抗体
- E. 前鼻镜检查鼻腔
- 9、首先应考虑以下哪种疾病（ ）
- A. 鼻息肉
- B. 鼻咽癌
- C. 慢性鼻窦炎
- D. 鼻中隔偏曲
- E. 鼻咽血管纤维瘤
- 10、患者拟于鼻内镜下行肿瘤切除术，以下措施正确的是（ ）
- A. 术前一天备血
- B. 术前行颈动脉造影及栓塞术，以减少术中出血
- C. 术前查血常规、肝肾功能、出凝血时间及输血前体检项目
- D. 以上都是
- E. 以上都不是

（二）填空题

- 1、鼻前庭囊肿与牙源性囊肿的鉴别要点是_____或_____。
- 2、鼻窦黏液囊肿多见于_____。
- 3、鼻窦最常见的囊肿是_____。
- 4、鼻前庭囊肿是指位于_____、_____、_____的囊性肿块。
- 5、鼻息肉常见的病理类型_____。

（三）名词解释

- 1、鼻腔鼻窦良性肿瘤

（四）简答题

1、筛窦黏液囊肿的临床表现和治療措施是什么？

四、参考答案与解析

(一) 选择题

A1 型题

1	A	2	C	3	E	4	C	5	A	6	B	7	D	8	A	9	C	10	C
11	A	12	E	13	E	14	E	15	A	16	A	17	D	18	C	19	B	20	A

答案解析：

18、C。备选答案是鼻腔及鼻窦的一些常见的良性肿瘤，其中血管瘤是最常见的，所以正确答案为血管瘤。

19、B。鼻腔良性肿瘤中易复发、易恶变的是内翻性乳头状癌。要求掌握鼻腔的一些常见良性肿瘤如血管瘤、乳头状瘤、骨瘤的临床特征。

A3 型题

1	C	2	E	3	A	4	C	5	A	6	C	7	E	8	D	9	E	10	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

(二) 填空题

- 1、囊肿内不含牙；囊肿相应部位的上列牙无病变
- 2、筛窦
- 3、黏液囊肿
- 4、鼻前庭底部皮下；状孔的前外方；上颌骨牙槽突浅面软组织内
- 5、水肿型

(三) 名词解释

1、鼻腔鼻窦良性肿瘤主要指乳头状瘤、上颌窦出血坏死性息肉、鼻咽纤维血管瘤、鼻腔血管瘤，是危害人体生命健康安全的重要疾病之一。

(四) 简答题

1、筛窦黏液囊肿的临床表现和治療措施是什么？

根据囊肿的大小及侵犯部位，筛窦黏液囊肿的临床表现和治療措施如下：

(1) 临床表现：

1) 眼部表现：囊肿侵犯眶内所致。①眼球移位；②流泪、复视、视力障碍等；③眶尖综合征。

2) 面部表现: 筛窦囊肿可使内眦部隆起, 隆起处皮肤正常, 触诊表面光滑, 乒乓球感, 一般无压痛。

3) 鼻部表现: ①自发间歇性清亮鼻溢; ②鼻腔检查可见中鼻道或筛泡向下膨隆; ③鼻塞、流涕、嗅觉减退; ④脑脊液鼻漏。

4) 其他表现: ①头痛或麻木感; ②闭经、性欲减退、尿崩等内分泌症状; ③脑膜炎; ④全身症状, 脓囊肿伴发热和全身不适。

(2) 治疗措施: 手术是唯一的治疗方法。鼻内镜下开放筛房, 建立筛窦及囊肿腔与鼻腔之间的永久和宽敞的引流通道。合并球后视神经炎致视力下降或失明时, 在囊肿切除后行视神经减压术; 伴脑脊液鼻漏时, 同时行脑脊液鼻漏修补术; 有眶尖综合征时行眶内减压术。