

第五节

三、习题

(一) 选择题

A1 型题

- 1、下列综合征是鼻中隔偏曲表现之一的是 ()
 - A. 宽大开放空间综合征
 - B. 翼腭窝综合征
 - C. 什鲁德综合征
 - D. 颞下颌关节综合征
 - E. 朝特综合征
- 2、鼻中隔偏曲的临床表现中，错误的是 ()
 - A. 鼻塞
 - B. 鼻出血
 - C. 反射性头痛
 - D. 嗅觉减退
 - E. 可引起打鼾
- 3、关于鼻中隔偏曲，叙述错误的是 ()
 - A. 当鼻中隔软骨性支架与鼻腔侧壁骨的发育速度不一致时，可导致鼻中隔偏曲
 - B. 腺样体肥大患者常伴有鼻中隔偏曲
 - C. 新生儿不会出现鼻中隔偏曲
 - D. 鼻中隔偏曲患者的鼻出血多发生在鼻中隔凸出的一侧
 - E. 鼻咽纤维血管瘤可导致鼻中隔偏曲
- 4、鼻中隔偏曲的主要症状包括 ()
 - A. 鼻塞
 - B. 头痛
 - C. 鼻出血
 - D. 流鼻涕
 - E. 以上都是
- 5、单纯性鼻中隔偏曲最常见的病因是 ()

- A. 鼻中隔外伤
 - B. 鼻内肿瘤压迫
 - C. 异物压迫
 - D. 腺样体肥大
 - E. 鼻中隔之骨和软骨发育不均衡
- 6、较小的鼻中隔血肿应采取的治疗是 ()
- A. 低位切开排淤，填塞双侧鼻腔
 - B. 切开引流，不填塞鼻腔
 - C. 鼻中隔矫正术
 - D. 穿刺抽液
 - E. 穿刺冲洗
- 7、有关鼻中隔血肿叙述哪一项不正确 ()
- A. 主要由鼻中隔手术或外伤引起
 - B. 鼻中隔血肿为手术或外伤引起，无自发性鼻中隔血肿
 - C. 对较小的血肿，行穿刺抽吸即可
 - D. 长时间的血肿，鼻中隔软骨可因血供不足而发生无菌性坏死，致塌鼻
 - E. 须应用抗生素预防感染
- 8、有关鼻中隔血肿的治疗，正确的是 ()
- A. 鼻腔烧灼
 - B. 切开引流，不行鼻腔填塞
 - C. 切开引流，行鼻腔填塞
 - D. 前鼻孔填塞
 - E. 后鼻孔填塞
- 9、鼻中隔术后发生鼻中隔血肿，其处理关键是 ()
- A. 立即应用止血药
 - B. 立即应用抗生素预防感染
 - C. 立即清除血肿，鼻腔填塞压迫止血
 - D. 立即鼻部冷敷
 - E. 立即拔出鼻腔内填塞纱条，鼻腔内滴药

10、鼻中隔脓肿最常见于 ()

- A. 鼻中隔血肿继发感染
- B. 鼻中隔术后
- C. 邻近组织感染波及
- D. 急性鼻窦炎
- E. 慢性鼻窦炎

11、鼻中隔穿孔最常见的部位在 ()

- A. 鼻中隔后上部
- B. 鼻中隔后下部
- C. 鼻中隔顶部
- D. 鼻中隔前下部
- E. 鼻中隔前上部

12、梅毒引起的鼻中隔穿孔多位于 ()

- A. Little 区
- B. 鼻中隔前上部
- C. 鼻中隔前下部
- D. 鼻中隔骨部
- E. 鼻中隔软骨部

13、鼻腔及鼻窦异物常见的临床表现不包括 ()

- A. 单侧鼻塞
- B. 鼻臭
- C. 鼻出血
- D. 头痛
- E. 大量水样涕

14、以下哪项不是鼻骨骨折后的临床表现 ()

- A. 移位和畸形
- B. 鼻出血
- C. 鼻通气障碍
- D. 眼睑部瘀斑

E. 复视

15、鼻骨骨折最常见的症状是 ()

A. 外鼻肿胀

B. 鼻背塌陷

C. 鼻出血

D. 皮下淤血

E. 皮下气肿

16、若为鼻骨骨折，复位最迟应于什么时间进行 ()

A. ≤ 1 天

B. ≤ 10 天

C. ≤ 5 天

D. ≤ 3 天

E. ≤ 15 天

17、鼻骨骨折后，行鼻骨复位术的时间不宜超过 ()

A. 1 周

B. 2 周

C. 3 周

D. 4 周

E. 5 周

18、有关鼻出血的说法中，正确的是 ()

A. 鼻出血的原因多见于血液病

B. 出血主要来源于颈内动脉分支

C. 一般出血应保持头高位

D. 通常的处理方法是后鼻孔填塞

E. 不会导致休克

19、处理鼻出血的方法中，错误的是 ()

A. 轻微出血可采用局部止血法

B. 凡有鼻出血均采用鼻后孔填塞

C. 找不到出血点时可先用鼻孔填塞

- D. 有明确的出血点可用冷冻或烧灼止血
- E. 局部止血的同时全身可适当应用止血药

20、下列关于鼻出血的说法，正确的有（）

- A. 年轻人的鼻出血大多发生在黎氏区
- B. 与鼻中隔偏曲有关、血液病可引起鼻出血
- C. 前鼻孔填塞未能止血者可用后鼻孔填塞法
- D. 反复少量一侧鼻出血应怀疑恶性肿瘤
- E. 以上都是

A3 型题

(1~2 题共用题干)

患者男，17 岁，反复发作性鼻腔、口腔出血 2 年，每次出血量约 100~300ml，伴有双侧渐进性鼻阻塞，多涕、头昏、耳鸣，左耳听力下降症状。查体：神清，轻度至中度贫血面容。电子鼻咽镜检查：鼻咽部、后鼻孔有淡红色新生物，表面尚光滑。颈部触诊：左侧胸锁乳突肌中段深面触及 2 个约 1.5cm×1cm×0.5cm 淋巴结，光滑、活动，无压痛。

1、为减少术中出血，该患者术前可行（）

- A. CT
- B. MRI
- C. DSA+血管栓塞
- D. 应用止血药物
- E. 抗生素控制炎症

2、对此患者手术最好选用的麻醉方式为（）

- A. 连续硬膜外麻醉
- B. 针刺麻醉+中药麻醉
- C. 颈丛麻醉
- D. 常规气管插管全身麻醉
- E. 气管插管全麻+控制性低血压

(3~6 题共用题干)

患者男，56 岁，鼻部撞伤后，有血性液体自鼻孔流出，色淡。

- 3、下列不能提示脑脊液鼻漏的是 ()
- A. 低头用力或压迫颈静脉流量增加
 - B. 有反复发生细菌性脑膜炎的病史
 - C. 流出的液体干燥后呈痂状者
 - D. 手帕或纸上的痕迹中心呈粉红色而周边色淡、清澈
 - E. 葡萄糖定量分析, 即在 1.7mmol/L 以上
- 4、该患者确诊为脑脊液鼻漏, 引起该疾病颅脑外伤的原因最常见的是 ()
- A. 颞骨骨折
 - B. 额骨骨折
 - C. 颅中窝骨折
 - D. 颅前窝骨折
 - E. 筛骨垂直板骨折
- 5、对该患者的处理不正确的是 ()
- A. 止咳通便
 - B. 避免喷嚏和用力擤鼻
 - C. 降低颅内压
 - D. 预防感染
 - E. 尽早手术
- 6、如行手术治疗, 以下手术前确定漏出点的方法最好的是 ()
- A. 鼻内镜法
 - B. 放射性核素 SPECT 法
 - C. 前鼻镜
 - D. 间接鼻咽镜
 - E. 高分辨 CT

(7~10 题共用题干)

患者男, 35 岁, 鼻塞、流脓涕、嗅觉减退 1.5 年。曾两次手术。查体: 体温 37.2℃。鼻咽部、耳部、喉部无异常。全身检查无阳性体征。

- 7、如上述检查发现双侧鼻腔充满荔枝肉样肿物, 为了解鼻窦情况目前应做的辅助检查是 ()

- A. 鼻窦 CT
 - B. 鼻内镜检查
 - C. 鼻窦 MRI
 - D. X 线鼻窦平片检查
 - E. 鼻窦 B 超检查
- 8、入院后应对患者进行的最有价值的常规检查是 ()
- A. 鼻窦 CT
 - B. 前鼻镜检查鼻腔
 - C. 鼻窦 MRI
 - D. 肝肾功能
 - E. 血常规
- 9、上述检查发现有全组鼻窦炎，上颌窦有液平面，术前应做的准备不包括 ()
- A. 使用抗生素
 - B. 口服糖皮质激素
 - C. 上颌窦穿刺冲洗
 - D. 心电图检查
 - E. 鼻窦 B 超检查
- 10、如该患者有支气管哮喘的病史，正确的治疗方案不包括 ()
- A. 尽量在全麻下手术
 - B. 术前口服泼尼松 30mg/d
 - C. 手术当晨肌注地塞米松 10mg，术后口服泼尼松 30mg，维持 1 周
 - D. 出院后改用糖皮质激素气雾剂喷鼻 4~12 周
 - E. 尽量在局麻下手术，避免诱发哮喘

(二) 填空题

- 1、鼻中隔偏曲主要病因是____、____所致。
- 2、鼻中隔穿孔最常见部位在_____。
- 3、了解鼻骨骨折首选的影像学检查方法是_____。
- 4、鼻骨骨折应在外伤后_____内处理为宜。
- 5、鼻出血的原因大致可分为_____因素和_____因素两类。

6、鼻出血的好发部位是_____。

(三) 名词解释

- 1、鼻中隔偏曲
- 2、鼻中隔血肿
- 3、鼻中隔穿孔
- 4、鼻腔鼻窦异物
- 5、利特尔区
- 6、鼻出血

(四) 简答题

- 1、简述鼻中隔偏曲的临床表现?
- 2、简述鼻中隔血肿及脓肿的临床表现?
- 3、简述鼻骨骨折的处理原则?
- 4、简述鼻出血的治疗原则?
- 5、幼儿鼻出血应如何处理?
- 6、简述鼻出血的预防和处理?

四、参考答案与解析

(一) 选择题

A1 型题

1	A	2	E	3	C	4	E	5	E	6	D	7	B	8	C	9	C	10	A
11	D	12	D	13	E	14	E	15	C	16	B	17	B	18	C	19	B	20	E

答案解析:

- 7、B。自发性血肿可见于血液系统疾病。
- 9、C。血肿出现后应尽快清除血肿后填塞，防止再次出血。
- 14、E。复视并不是鼻骨骨折的临床表现，而是眼眶骨折的临床表现之一。

A3 型题

1	C	2	E	3	C	4	D	5	E	6	A	7	A	8	B	9	E	10	E
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

(二) 填空题

- 1、组成鼻中隔的诸骨发育不均衡诸骨间连接异常
- 2、鼻中隔前下部
- 3、X线
- 4、2~3小时
- 5、局部 全身
- 6、鼻中隔前下方

(三) 名词解释

- 1、鼻中隔偏曲是指鼻中隔向一侧或双侧，或局部有突起，并引起鼻腔功能障碍，如鼻塞、鼻出血和头痛等症状。
- 2、鼻中隔血肿是指鼻中隔软骨或骨膜下积血。
- 3、鼻中隔穿孔是由于各种原因导致鼻中隔的任何部位形成大小不等、形状各异的永久性穿孔，使两侧鼻腔相通。
- 4、鼻腔鼻窦异物是指由于各种原因使外来物质进入鼻腔、鼻窦，或内生物物质滞留于鼻腔、鼻窦者。
- 5、利特尔区是指中隔最前下部的黏膜下血管密集，分别由颈内动脉系统和颈内静脉系统的分支汇聚成的血管丛，称利特尔区，是鼻出血的好发部位，称“易出血区”。
- 6、鼻出血指血液由鼻腔流出，常由鼻、鼻窦及其邻近部位局部病变、外伤，以及某些影响鼻腔血管状态和凝血机制的全身性疾病引起，是鼻科常见症状和急症之一。

(四) 简答题

- 1、简述鼻中隔偏曲的临床表现？
 - (1) 鼻塞：为主要症状。或单侧鼻塞、或双侧鼻塞，多呈持续性。
 - (2) 头痛：鼻中隔偏曲的凸出部位压迫同侧鼻甲时，可引起同侧反射性头痛。
 - (3) 鼻出血：常发生在鼻中隔偏曲之凸面或骨嵴处的顶尖部。由于此处黏膜薄，受气流和尘土的刺激易发生黏膜糜烂而引起出血。

(4) 鼻窦炎：鼻中隔偏曲所致的鼻阻塞影响鼻窦引流时，可继发鼻窦炎。长期鼻塞、张口呼吸，易发生感冒和上呼吸道感染，可伴有鼾声。

2、简述鼻中隔血肿及脓肿的临床表现？

(1) 鼻中隔血肿：多为双侧鼻塞、额部头痛和鼻梁部发胀。若有鼻黏膜破裂，有血性分泌物流出。

(2) 鼻中隔脓肿：患者除有前者的一些症状外，尚有畏寒、发热、全身不适、鼻梁及鼻尖红肿热痛症状。

3、简述鼻骨骨折的处理原则？

鼻骨骨折的处理原则是：鼻骨骨折应在外伤后 2~3 小时内处理，鼻骨复位术应在 10 天内进行，不应超过 2 周。对于闭合性鼻骨骨折，无错位性骨折无须复位；错位性骨折可在鼻腔表面麻醉行鼻内或鼻外法复位，注意进入鼻腔用于鼻骨复位的器械不能超过两侧内眦的连线，以免损伤筛板。对于开放性鼻骨骨折，应争取一期完成清创缝合与鼻骨骨折的复位。鼻中隔损伤出现偏曲、脱位等情况时，应做开放复位。鼻额筛眶复合体骨折多合并其他严重的颅脑损伤，以开放复位为宜。

4、简述鼻出血的治疗原则？

鼻出血属于急诊①一般处理：患者取坐位或半卧位，嘱患者尽量勿将血液咽下，以免刺激胃部引起呕吐，必要时给予镇静剂；②鼻局部处理；③全身治疗。

5、幼儿鼻出血应如何处理？

(1) 安慰小儿不要紧张，安静地坐着。

(2) 头略低（注意不是仰头，仰头时血将流入咽部，导致咽血。虽从鼻孔流出的血很少，但很可能忽略了严重出血）。

(3) 止血后，2~3 小时内不要做剧烈运动。

(4) 出血较多时，可用脱脂棉卷塞入鼻腔，填塞紧些才能止血。若有麻黄素滴鼻液，可把药洒在棉卷上，止血效果更好。

(5) 若经上述处理，鼻出血仍不止，立即去医院处理。

(6) 若自鼻孔流出的血已不多，但小儿有频繁的吞咽动作，一定让他把口水吐出来。若吐出的为鲜血，说明仍在流血，要送医院处理。

(7) 如果常发生鼻出血，而且皮肤上常有瘀斑，小伤口出血也不易止住，

应去医院做全面检查。

6、简述鼻出血的预防和处理？

鼻出血的预防如下：保持室内相对湿度在 50~60%，以防止鼻粘膜干燥而增加出血机会；鼻腔干燥时，可用棉签蘸少许液状石蜡或抗生素软膏轻轻涂擦，每日 3~4 次。以增加鼻粘膜的柔韧性，防止干裂出血；指导患者勿用力擤鼻涕，以防止鼻腔压力增大促使毛细血管扩张、渗血增多；防止鼻部外伤。护理如下：少量出血时，可用棉球或明胶海绵填塞。无效者可用 1:1000 肾上腺素棉球填塞，并局部冷敷；出血严重时，尤其是后鼻腔出血可用凡士林油纱条做后鼻腔填塞术，术后定时用无菌液状石蜡滴入，以保持黏膜湿润，术后 3 天可轻轻取出油纱条，若仍有出血，需更换油纱条再填塞。患者鼻腔填塞后，被迫张口呼吸，应加强口腔护理、保持口腔湿润，增加患者舒适感，同时可避免感染发生。