

## 第八节

### 三、习题

#### (一) 选择题

##### A1 型题

- 1、发生于鼻腔鼻窦的骨瘤最常见于 ( )
  - A. 额窦
  - B. 上颌窦
  - C. 鼻中隔
  - D. 筛窦
  - E. 蝶窦
- 2、下列鼻腔鼻窦恶性肿瘤中，不提倡活检的是 ( )
  - A. 嗅神经母细胞瘤
  - B. 鳞状细胞癌
  - C. 恶性黑色素瘤
  - D. 恶性淋巴瘤
  - E. 腺样囊性癌
- 3、关于鼻内翻性乳头状瘤的影像学特征，叙述错误的是 ( )
  - A. CT 表现为单侧鼻腔鼻窦内的结节状、条索状或不规则形软组织影
  - B. CT 表现为气泡征，是其特征性表现
  - C. 肿瘤组织在 MRI 的 T1WI 表现为中等信号
  - D. 肿瘤组织在 MRI 的 T2WI 表现为中等或稍高信号
  - E. 增强 MRI 表现为肿瘤组织不强化
- 4、鼻腔及鼻窦恶性肿瘤从病理学上分最多见的是 ( )
  - A. 鳞状细胞癌
  - B. 淋巴上皮癌
  - C. 腺癌
  - D. 肉瘤
  - E. 黏液表皮样癌
- 5、鼻窦恶性肿瘤以下哪个部位最多见 ( )

- A. 蝶窦
  - B. 额窦
  - C. 筛窦
  - D. 上颌窦
  - E. 以上都不是
- 6、鼻 NKT 细胞淋巴瘤是 ( )
- A. Wegener 肉芽肿
  - B. 原发于鼻腔的非霍奇金淋巴瘤 B 细胞型
  - C. 原发于鼻腔的非霍奇金淋巴瘤 T 细胞型
  - D. 原发于淋巴结外的具有特殊形态学的淋巴瘤
  - E. 特发性非愈合性肉芽肿
- 7、B 细胞淋巴瘤多位于鼻窦，多见于 ( )
- A. 西方人
  - B. 亚洲人
  - C. 墨西哥人
  - D. 南美洲人
  - E. 东方人
- 8、鼻及鼻窦肉瘤以下列何者最多 ( )
- A. 恶性淋巴瘤
  - B. 横纹肌肉瘤
  - C. 网状细胞肉瘤
  - D. 软骨肉瘤
  - E. 骨肉瘤
- 9、关于鼻及鼻窦骨瘤的叙述，正确的是 ( )
- A. 多发生于额窦，其次为筛窦
  - B. 多发生于上颌窦，其次为额窦
  - C. 多发生于筛窦，其次为额窦
  - D. 多发生于蝶窦，其次为筛窦
  - E. 多发生于上颌窦，其次为筛窦

10、鼻及鼻窦血管瘤可分为毛细血管瘤和海绵状血管瘤，前者约占（ ）

- A. 80%
- B. 60%
- C. 40%
- D. 20%
- E. 30%

11、鼻及鼻窦内翻性乳头状瘤好发于（ ）

- A. 鼻腔顶壁
- B. 鼻腔外侧壁
- C. 鼻腔内侧壁
- D. 鼻腔底壁
- E. 鼻腔下壁

12、一般认为上颌窦恶性肿瘤预后较好者起自窦腔（ ）

- A. 前下内部分
- B. 前下外部分
- C. 后上外部分
- D. 后上内部分
- E. 后上前部分

13、骨瘤患者有额部外伤史的比例是（ ）

- A. 10%
- B. 20%
- C. 30%
- D. 50%
- E. 60%

14、上颌窦恶性肿瘤预后最差者起自窦腔（ ）

- A. 前下内部分
- B. 前下外部分
- C. 后上外部分
- D. 后上内部分

E. 后上前部分

15、鼻腔恶性肿瘤以上皮源性癌肿为主，其中未分化癌和鳞状细胞癌占（ ）

A. 10%以上

B. 20%以上

C. 40%以上

D. 80%以上

E. 90%以上

16、上颌窦癌采用综合治疗，5年生存率是（ ）

A. 10%~20%

B. 20%~30%

C. 30%~40%

D. 40%~50%

E. 40%~60%

17、关于鼻腔内翻性乳头状瘤，以下哪项不正确（ ）

A. 切除后易复发

B. 5%~15%恶变可能

C. 色红或灰红，外观如乳头，颗粒或桑葚样

D. 质地较息肉硬

E. 质地较息肉软

18、鼻及鼻窦内翻性乳头状瘤多次手术后易产生恶性变，恶变率为（ ）

A. 1%

B. 7%

C. 17%

D. 27%

E. 37%

19、一筛窦癌患者，根据(UICC)TNM(1997)分类标准为 TNM，该患者分期应为（ ）

A. 0期

B. 1期

C. 2期

D. 3 期

E. 4 期

20、肉瘤占鼻腔鼻窦恶性肿瘤的比例 ( )

A. 1%~5%

B. 5%~10%

C. 10%~20%

D. 20%~25%

E. 30%~35%

A3 型题

(1~3 题共用题干)

患者女, 52 岁, 右侧进行性鼻塞, 涕血 3 个月余, 鼻腔检查见右侧鼻腔暗红色新生物, 质较硬, 触之出血不多, 似来自鼻顶部, 下部达右下鼻甲上缘。

1、该患者应进一步做的检查是 ( )

A. 鼻内镜检查

B. 鼻窦 A 超检查

C. 新生物穿刺检查

D. 新生物病理检查

E. 鼻分泌物涂片细胞学检查

2、若活检证实为嗅母细胞瘤, 还需作的必要检查是 ( )

A. 鼻窦 CT 扫描或 MRI 检查

B. 鼻窦 A 超检查

C. 嗅觉检查

D. 鼻内镜检查

E. 鼻部 X 线拍片检查

3、若 CT 扫描显示, 肿瘤主要位于鼻腔内, 筛板局部破坏, 颅内未见肿瘤, 该患者较好的治疗方法应是 ( )

A. 化疗

B. 放疗 + 化疗

C. 放疗

- D. 手术
- E. 手术 + 放疗

(4~8 题共用题干)

患者女, 52 岁, 左鼻涕中带血, 左面部隆起, 伴左磨牙松动、疼痛 2 个月。曾在外院拔除左上颌牙齿 2 颗, 检查鼻腔未见新生物, 左中鼻道少许脓性分泌物, 左上拔牙处未愈合。

4、该疾病的治疗原则是 ( )

- A. 以手术为主的综合治疗
- B. 放射治疗为主
- C. 化疗为主
- D. 传统中医药为主
- E. 化疗+放疗

5、入院后需要做的辅助检查有 ( )

- A. 鼻窦 CT 检查了解鼻窦情况、鼻内镜检查
- B. 胸部 X 线拍片检查、心电图检查
- C. 腹部 B 超检查
- D. 查肝肾功能
- E. 以上都是

6、活检证实为左上颌窦癌, 该疾病临床上诊断应与哪些疾病鉴别? ( )

- A. 血管瘤
- B. 乳头状瘤
- C. 鼻息肉
- D. 上颌窦良性出血性新生物及上颌窦囊肿
- E. 以上都是

7、该疾病的放射治疗不适用于 ( )

- A. 对射线敏感的恶性肿瘤, 如肉癌、鳞癌
- B. 晚期患者的姑息性治疗
- C. 术后复发者
- D. 术前放疗

- E. 术后放疗
- 8、该疾病晚期症状及表现包括 ( )
- A. 眼球移位
- B. 张口困难
- C. 面颊部隆起
- D. 硬腭隆起及颈淋巴结转移
- E. 以上都是

(9~10 题共用题干)

患者女，48 岁，左侧鼻塞、涕中带血，嗅觉减退 3 个月。

- 9、若 CT 检查示肿瘤局限于鼻腔内，未侵入颅内；头部 MRI 检查亦未发现颅内肿瘤侵犯。该患者应采取的治疗是 ( )
- A. 保守治疗
- B. 中药治疗
- C. 单纯放疗
- D. 单纯化疗
- E. 手术彻底切除 + 放疗
- 10、应做哪些检查来明确诊断 ( )
- A. 鼻咽部 CT
- B. 鼻腔新生物病理检查
- C. 鼻窦 A 超检查
- D. 鼻阻力检查
- E. 新生物摘除后活检

## (二) 填空题

- 1、常见的鼻腔良性肿瘤有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
- 2、位居鼻及鼻窦恶性肿瘤发病率前 3 位的分别是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
- 3、鼻及鼻窦肿瘤主要好发于\_\_\_\_\_内，其次是\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_则较少。
- 4、鼻腔、鼻窦恶性肿瘤以\_\_\_\_\_为主，因部位隐蔽，\_\_\_\_\_症状少，就诊者多为\_\_\_\_\_。
- 5、鼻腔、鼻窦恶性肿瘤的发病因素类似，包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

### (三) 名词解释

1、恶性黑色素瘤

### (四) 简答题

1、简述鼻腔恶性肿瘤的临床表现?

## 四、参考答案与解析

### (一) 选择题

A1 型题

1	A	2	C	3	E	4	A	5	D	6	D	7	A	8	A	9	A	10	A
11	B	12	A	13	D	14	D	15	D	16	C	17	D	18	B	19	D	20	C

答案解析:

4、A。鼻腔及鼻窦恶性肿瘤按病理分为癌肿及肉瘤，癌肿按来源又有多种，其中鳞状细胞癌最多见，约为 70%~80%。

6、D。鼻 NKT 细胞淋巴瘤是原发于淋巴结外的具有特殊形状学的淋巴瘤，是一种鼻部的结外淋巴瘤。

A3 型题

1	A	2	A	3	E	4	A	5	E	6	E	7	E	8	E	9	E	10	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

### (二) 填空题

1、乳头状瘤 血管瘤 神经纤维瘤

2、鳞状细胞癌 腺癌 淋巴上皮癌

3、鼻腔 鼻窦 外鼻

4、原发 早期 晚期

5、长期慢性炎症刺激 经常接触致癌物质 良性肿瘤恶变 放射性物质 遗传基因

### (三) 名词解释

1、恶性黑色素瘤是黑色素细胞来源的一种高度恶性的肿瘤，简称恶黑，多发生于皮肤，也可见于黏膜和内脏，约占全部肿瘤的 3%。

### (四) 简答题

1、简述鼻腔恶性肿瘤的临床表现？

早期仅有单侧的鼻塞、鼻出血等症状，以后可以出现鼻、面部麻木感、胀满感，顽固性头疼，进行性单侧鼻塞，反复少量出血，嗅觉减退或消失，面颊部隆起、眼球移位、张口困难等表现。