患者自我管理指导问与答

问题 1: 肝硬化患者应该如何调整饮食?

答:肝硬化患者应遵循低盐、低脂、适量优质蛋白的饮食原则。避免粗糙、刺激性食物,如坚果、洋葱、大蒜等,防止食管胃底静脉 曲张破裂出血,可多吃富含维生素的食物,如新鲜蔬菜和水果,戒烟 戒酒。对于大颗粒药物,可将其研磨呈粉状后予以温水送服。

问题 2: 肝硬化患者如何预防肝性脑病?

答: 肝硬化患者预防肝性脑病应注意以下方面: 在饮食上应限制蛋白质摄入, 尤其是动物蛋白, 选择植物蛋白, 蛋白摄入以1.2~1.5g/kg/d, 如体重为60kg, 每日摄入量为72~90g/d。同时保持大便通畅, 避免便秘, 遵医嘱使用乳果糖或利福昔明, 减少肠道氨吸收。注意观察有无肝性脑病相关症状, 如精神错乱、行为失常、计算力及定向力改变等。

问题 3: 肝硬化患者出现腹水怎么办?

答: 肝硬化患者出现腹水应限制钠盐摄入,每日钠盐摄入控制在2g以下(5.0~6.9g/d食盐)。遵医嘱规范使用利尿剂,监测尿量、体重及腹围情况。对于放置腹腔引流管者,应注意保持管道清洁,并由专业人员进行护理。

问题 4: 肝硬化患者如何预防感染?

答: 肝硬化患者预防感染应注意: 保持良好的个人卫生,避免接触感染源; 定期监测体温,早期发现感染迹象。对于腹水患者,定期进行腹水检查,预防自发性细菌性腹膜炎。对于已感染者,按医嘱规范用药,切勿自行更改或停药。

问题 5: 肝硬化患者可以进行哪些运动?

答:适度的轻度运动(如散步、慢跑、太极等)有助于改善身体 状况,可制定每天30min运动计划,避免剧烈运动,积极开展康复训 练,有助于免疫力增强,促进康复。但对于有腹水或静脉曲张的患者, 运动前应咨询专业医生意见。

问题 6: 肝硬化患者可以接种疫苗吗?

答:对于未感染甲肝或乙肝病毒患者,可接种疫苗预防感染,每年可接种流感疫苗,降低感染风险,建议在医生指导下进行接种,接种前由专业医生进行评估后方可接种。

问题 7: 肝硬化患者如何预防并发症?

答: 肝硬化患者最常见并发症为急性上消化道出血, 最严重的并发症为肝性脑病。院外应做好定期复查肝功能、血常规、B超等检查, 遵医嘱合理使用相关药物, 避免自行增减药物, 定期监测腹围、体重, 保持大便通畅, 预防便秘, 减少氨的吸收, 同时注意个人卫生, 避免

接触感染源。